

Результаты анкетирования стоматологов г. Минска по вопросам оказания стоматологической лечебно- профилактической помощи женщинам при беременности

Михолап Бажена Сергеевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) Макарова Ольга Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Потребность в стоматологическом лечении возникает приблизительно у 95% беременных женщин. Эта категория пациентов представляет отдельную группу риска на стоматологическом приеме из-за сложности их психофизиологического состояния и потенциальной опасности тератогенного воздействия манипуляций и медикаментов.

Цель исследования

Анализ информированности стоматологов Минска в вопросах оказания стоматологической лечебно-профилактической помощи беременным.

Материалы и методы

Анкетирование 46 практикующих врачей-стоматологов по вопросам подходов к стоматологическим манипуляциям у беременных женщин, статистическая обработка полученной информации.

Результаты

Почти половина респондентов (45,7%) считают, что беременность может сама по себе приводить к ухудшению состояния периодонта и твердых тканей зубов. 26% опрошенных врачей-стоматологов не считают наличие кариеса (его осложнений) и заболеваний периодонта фактором риска неблагоприятного течения и исхода беременности. Тем не менее все рекомендуют санацию полости рта при беременности при наличии необходимости. Высокий уровень знаний выявлен по вопросам проведения профилактических мероприятий, использования рентгенологического метода и положения пациентки в кресле. 71,7% опрошенных рекомендуют для полосканий хлоргексидин, который при беременности использовать нежелательно. 50% врачей-стоматологов используют для обезболивания мепивакаин, который при беременности не рекомендуется к применению. Более половины анкетированных не отметили возможность развития диспноэ в положении на спине и при физических нагрузках, а наличие отеков и гипертензии 50% врачей отнесли к физиологическим особенностям беременных женщин. Низкий уровень знаний выявлен в отношении психоэмоциональных особенностей будущих мам. Печать о санации полости рта 56,5% врачей-стоматологов ставят обоснованно, остальные не учитывают наличие заболеваний периодонта, корней и разрушенных зубов, нуждающихся в удалении.

Выводы

Выявлен высокий интерес и положительная мотивация среди практикующих врачей-стоматологов в отношении оказания стоматологической помощи женщинам во время беременности. Носуществует необходимость устранения нехватки информации и выработки единых подходов к оказанию лечебно-профилактической стоматологической помощи беременным.