

Распространенность гиперчувствительности твердых тканей зубов среди школьников и студентов г.Минска.

Черевако Елизавета Георгиевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бурак Жанна Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Гиперчувствительность твердых тканей зубов (ГЧТТЗ) «молодеет» и все чаще встречается у молодых людей, подростков и даже детей. Это может быть объяснено физиологической гипоминерализацией эмали после прорезывания зубов, употреблением сладких газированных напитков и другими факторами. В свете вышеизложенного целесообразным представляется изучение распространенности ГЧТТЗ среди школьников и студентов г. Минска.

Цель исследования

Изучить распространенность и особенности ГЧТТЗ у школьников и студентов г. Минска.

Материалы и методы

При помощи специально разработанной для данного исследования анкеты было проведено анкетирование 100 школьников (возраст 14-16 лет) и 100 студентов (возраст 20-22 года) г. Минска. Полученные данные обработаны статистически.

Результаты

На момент проведения анкетирования ГЧТТЗ была отмечена у 15,0% школьников и 34,0% студентов. Не имели данной проблемы во время исследования, но страдали от нее раньше 35,0% школьников и 28,0% студентов. Таким образом, половина школьников (50,0%) и больше половины студентов (62,0%) хотя бы раз отмечали ГЧТТЗ. При анализе раздражителей, провоцирующих ГЧТТЗ, было выявлено, что чаще всего отмечалась болевая реакция на термические раздражители – ее указали 100,0% школьников и 45,2% студентов среди лиц, имеющих или имевших ранее ГЧТТЗ. На втором месте находилась реакция «на сладкое» - она была отмечена у 42,0% школьников и 29,0% студентов среди лиц, имеющих или имевших ранее ГЧТТЗ. Представляет интерес тот факт, что среди лиц, страдающих от ГЧТТЗ или имеющих ее в анамнезе, больше половины – 70,0% для школьников и 74,2% для студентов - ничего не предпринимали для решения данной проблемы.

Выводы

1 Школьники г.Минска реже страдают ГЧТТЗ зубов, чем студенты. 2 Наиболее часто болевую реакцию при ГЧТТЗ и у школьников, и у студентов вызывают термические раздражители.