

Эффективность проведенной у пациентов операции гемиколэктомия справа

Мурадян Самвел Аршакович, Мицкевич Владислав Евгеньевич

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Мороз

Елена Геннадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

В последние годы наблюдается рост уровня заболеваемости колоректальным раком. Оперативное вмешательство зачастую является единственным возможным радикальным методом лечения. Однако выбор анастомоза по-прежнему является нерешенной проблемой, в связи с чем появляется необходимость в оценке эффективности возможных вариантов.

Цель исследования

Оценка эффективности проведенной у пациентов операции гемиколэктомия справа.

Материалы и методы

В ходе работы обследовано 427 человек. Выкопировка данных о пациентах осуществлялась из медицинских карт стационарных пациентов (ф.003/у). Все пациенты пролечены на базе УЗ “Минский городской клинический онкологический диспансер”, оперированы в период с 2012г. по 2015г. по поводу рака толстой кишки. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ “Microsoft Office Excel 2010”, “Statistica 10.0”.

Результаты

Медиана возраста составила 76,5 (69-80) лет. Смертность пациентов после проведенной операции составила 20,1%. Среди умерших пациентов рецидивы наблюдались у 3,5%, метастазы у 58,1%. Среди живых пациентов рецидивы наблюдались у 0%, метастазы у 15,3%.

Выводы

1. Хирургическое лечение колоректального рака путем гемиколэктомии справа нуждается в модернизации в связи с высокой степенью метастазирования, в том числе приводящего к смерти пациента.