

Особенности носовых кровотечений у взрослых

Ващенко Николай Александрович, Юркевич Юлия Владимировна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Родионова Ольга Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Носовое кровотечение – распространенная патология, которая может проявляться как самостоятельной нозологической единицей, так и симптомом прочих заболеваний. Установление точной причины носовых кровотечений и знание механизма их возникновения необходимы для устранения данной патологии и предупреждения рецидивов.

Цель исследования

На клинических примерах установить причины, повлекшие за собой носовое кровотечение.

Материалы и методы

Проведено обследование 11 пациентов ЛОР отделения УЗ «9 ГКБ» с диагнозом «Носовое кровотечение», а также проанализированы 188 истории болезни пациентов, госпитализированных по поводу носового кровотечения в 2015 году.

Результаты

По результатам анализа 188 историй болезни, носовым кровотечениям чаще всего подвержены лица мужского пола – 56,4%; женского – 43,6%. Самой частой причиной носовых кровотечений является артериальная гипертензия (56,4%, из них 3,2% пришлось на артериальную гипертензию 1 степени, 44,1% - 2 степени, 9,1% - 3 степени). Травма послужила причиной носовых кровотечений у 30,9% пациентов, новообразование - 3,7%, ОРИ – 2,7%, цирроз печени – 2,7%, НЦД – 2,1%, кровотечение после хирургического вмешательства – 1%, не удалось установить причину в 0,5% случаях. Носовое кровотечение на фоне отклонения коагулограммы наблюдалось у 35,6% пациентов, на фоне тромбоцитопении – 12,2%. При обследовании 11 пациентов с диагнозом «Носовое кровотечение» была предпринята попытка установить синдром гипермобильности суставов, который обусловлен недостаточностью коллагена 1 типа, что приводит к «хрупкости сосудов». Для этого был проведен тест по Бейтону. Он оказался положительным у 2 пациентов, что связано с возрастными дистрофическими процессами. Синдром гипермобильности суставов имеет внесуставные проявления: грыжи различной локализации, пороки сердца, опущения органов, варикозное расширение вен. У 10 пациентов наблюдались 2 и более из вышеперечисленных признака.

Выводы

1. Артериальная гипертензия явилась наиболее частой причиной носовых кровотечений у взрослых; 2. Треть носовых кровотечений происходят на фоне измененной коагулограммы; 3. У большинства пациентов можно заподозрить синдром гипермобильности суставов.