

Асадчая К. А., Супрун М. В.
**ДИНАМИКА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА
ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ**
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буцель А. Ч.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Острый синусит относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека. По данным многих авторов, воспалительные заболевания околоносовых пазух составляют 25-30% стационарной ЛОР-патологии.

Цель: сравнить динамику течения острого гнойного гайморита у пациентов на фоне консервативного лечения и комплексного с применением пункции верхнечелюстной пазухи.

Задачи:

- 1 Определить частоту заболеваемости гайморитом среди женщин и мужчин в разных возрастных группах.
- 2 Определить частоту встречаемости клинических симптомов острого гнойного гайморита.
- 3 Сравнить течение острого гнойного гайморита у пациентов, получивших консервативное и комплексное лечение с применением пункции верхнечелюстной пазухи.

Материалы и методы. Объект исследования – 40 пациентов с острым гнойным гайморитом, которым проводилось консервативное лечение (первая группа – 20 пациентов) и консервативное с применением пункции (вторая группа – 20 пациентов). Проведен общий анализ крови, исследование ЛОР статуса, данных рентгенограмм околоносовых пазух до и после лечения.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов мужчин – 15, женщин – 25, средний возраст которых составил $43 \pm 15,65$ года. Наибольшая заболеваемость у мужчин в возрасте 21-30 лет – 7 человек, у женщин в возрасте 51-60 – 8 человек. У большинства пациентов выявлены симптомы заложенности носа – 35; подъем температуры тела до субфебрильных цифр – 19; боли в области околоносовых пазух – 35; ринорея – 33. Отмечалась гиперемия слизистой оболочки полости носа – 39, отток гнойного секрета из среднего носового хода – 22. У большинства пациентов отмечен нормальный общий анализ крови – 29. Длительность дней нетрудоспособности в 1, 2 группах пациентов 7-8 дней. Все пациенты были здоровы, что подтверждалось контрольной рентгенограммой.

Выводы:

- 1 Среди исследуемых случаев преобладали женщины в возрасте 51-60 лет с типичными для острого гайморита клиническими симптомами.
- 2 Длительность заболевания одинакова у пациентов на фоне консервативного лечения и комплексного с применением пункции верхнечелюстной пазухи.