

Зенькевич М. В., Бубиго В. В.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шоломицкая И. А.

2-ая кафедра внутренних болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Наличие легочных осложнений у пациентов с циррозом печени является показанием к отбору больных на трансплантацию печени. Известно, что легочные осложнения встречаются у 4 -19 % больных с циррозом печени независимо от его этиологии.

Цель: определить частоту встречаемости легочных осложнений у пациентов с циррозом печени.

Задачи:

1 Определить наиболее часто встречающееся легочное осложнение у больных с циррозом.

2 Изучить особенности лабораторных показателей у пациентов с циррозом, имеющих легочные осложнения.

3 Исследовать наиболее частую локализацию легочных осложнений.

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 100 историй больных с циррозом печени различной этиологии, находящихся на лечении в 9 ГКБ г. Минска. В исследование не включены пациенты, имеющие рак печени, метастазы в печень, хроническая сердечная недостаточность (III - IV по NYHA, 1964).

Результаты и их обсуждение. Среди 100 обследованных больных цирроз печени алкогольной этиологии наблюдался у 87(87%) пациентов, вирусной-13(13%).

У 3 (11.5%) больных с гидротораксом цирроз печени имел вирусную этиологию, у 23 (88.5%)-алкогольную. Из легочных осложнений наиболее чаще регистрировали печеночный гидроторакс, который встречался у 26 пациентов, из них у 15 (57.7%) процесс локализовался справа, у 7 (26.9%) - слева, у 4 (15.4%) – с двух сторон. У пациентов с печеночным гидротораксом чаще, чем у пациентов без гидроторакса, наблюдали гипопропротеинемию (42.3%), гипоальбуминемию (80.8%), гипербилирубинемия, повышение ГГТП (100%) и гипокоагуляцию.

Выводы:

1 Наиболее часто из легочных осложнений у больных с циррозом печени регистрировали печеночный гидроторакс, чаще находящийся справа.

2 Наличие печеночного гидроторакса коррелирует напрямую с тяжестью заболевания печени.

3 Печеночный гидроторакс чаще регистрировался у пациентов с алкогольным циррозом печени.