

Зазулинская О. Ю.
**ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ
 ПСОРИАЗОМ**

*Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Белугина И. Н.,
 д-р. мед. наук, доц. Копытов А. В.*

*Кафедра кожных и венерических болезней, кафедра психиатрии
 и медицинской психологии*

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Заболеваемость псориазом зачастую ассоциирована с психическим и психологическим состоянием, иногда способствует формированию или является следствием кожной патологии.

Цель: провести анализ психологического и психического статуса у лиц, страдающих псориазом, для повышения эффективности комплексных лечебно-профилактических мероприятий при данной патологии.

Материал и методы. Проведено исследование 95 человек. Из которых составили: 59 чел., страдающих псориазом (основная группа); 18 чел. страдающих невротическими расстройствами (группа сравнения); 18 чел. – контрольная группа, без кожной и психической патологии. Психологические тесты: SCL-90-R, тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Типы поведения в конфликте», «Рисунок человека». Статистическая обработка SPSS.17.0.

Результаты и их обсуждение. При статистической обработке данных не установлено отличий среднегрупповых показателей мотивации на успех и мотивации на неудачу. Не установлено достоверных показателей по опроснику «Типы поведения в конфликте» по критериям: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. По тесту «Рисунок человека» было выявлено: в ОГ преобладают лица у которых в рисунке имеется критерий наличие одежды ($\chi^2=7,8$; $p<0,05$). Отсутствие кистей преобладает в группе невротиков, а наличие соответственно в группе псориаза и контрольной ($\chi^2=6,5$; $p<0,05$). Преобладает заштрихованность в ОГ и КГ, отсутствует в группе невротиков ($\chi^2=6,3$; $p<0,05$). В группе с невротиками достоверно больше лиц с наличием несоразмерности ног и тела ($\chi^2=5,9$; $p<0,05$). У лиц страдающих псориазом и невротическими расстройствами достоверно больше субъектов, не рисующих шею ($\chi^2=7,7$; $p<0,05$). О (I) группа крови преобладает у лиц с псориазом.

Выводы: 1 Для лиц, страдающих псориазом, более характерны психологические проблемы, свидетельствующие о сдержанности, избирательности и неудовлетворенности контактами при достаточной мотивации на их необходимость.

2 Лицам, страдающим псориазом, характерно наличие тревожности при недостаточном количестве ресурсов для разрешения имеющихся большого количества социальных проблем.

3 Для диагностики психологических проблем у лиц страдающих псориазом предпочтительнее применять невербальные методы психологической диагностики.