

Логина Т. Н.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА

Научный руководитель ассист. Василенко А. И.

Кафедра инфекционных болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Актуальность исследования связана с широкой распространенностью, многообразием клинических форм, проблемами ранней диагностики синдрома серозного менингита.

Цель: изучить особенности клинического течения, сроки обращаемости и симптоматику на догоспитальном этапе пациентов с клиникой серозного менингита.

Задачи:

1 анализ данных анамнеза

2 выявление особенностей клинико-лабораторных данных

Материал и методы. Проспективное исследование включало в себя 31 пациента с синдромом серозного менингита, находящихся на лечении в отделении нейроинфекций УЗ “Городская клиническая инфекционная больница” в период с сентября 2014 года по февраль 2015 года. Всем пациентам проводился сбор анамнеза методом анкетирования с изучением данных медицинских карт стационарных пациентов.

Результаты и их обсуждение. В результате анализа выявлено, что по поводу заболевания чаще обращаются женщины (54,8%) в двух возрастных группах - от 18 до 29 лет (41,9%) и старше 50 лет (35,5%). 17 пациентов (54,8%) первично обращались в поликлинику. Из данного числа в 11 случаях (64,7%) обращение завершилось безрезультатно, в 3 случаях (17,6%) пациенты были направлены на стационарное лечение в УЗ “ГКИБ”. При оценке особенностей клинического течения установлено, что ведущим симптомом в 29 случаях (93,5%) являлась головная боль продолжительного характера (72,4%), усиливающаяся при движении (34,5%), не купирующаяся медикаментами (78,6%). В 23 случаях (74,2%) отмечалась субфебрильная температура тела, не зависящая от времени суток (73,9%). В 14 случаях (53,8%) повышенная температура тела сохранялась более 3 суток. В 8 случаях (25,8%) заболеванию предшествовала вирусная либо бактериальная инфекция (ОРЗ в 62,5% случаев), в 8 случаях (25,8%) отмечался укус клеща, в 9 случаях (29%) предрасполагающий фактор выявить не удалось.

Выводы:

1 17 пациентов (54,8%) первично обращались в поликлинику, из них 3 (17,6%) были направлены на стационарное лечение по основному заболеванию в УЗ “ГКИБ”. В 9 случаях (29%) предрасполагающий фактор к развитию заболевания неизвестен.

2 Ведущим симптомом в 29 случаях (93,5%) являлась головная боль продолжительного характера (72,4%), в 23 случаях (74,2%) отмечалась субфебрильная температура.