

Снитич Е. Л., Труш М. Ю.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАНГРЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А.

Кафедра общей хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (ОАСНК) - это системное хроническое заболевание артерий, обменно-дистрофического характера, которое приводит к органным (и)или общим расстройствам кровообращения. ОАСНК является частой патологией и встречается примерно у 2-3 % населения, из них в 40-50 % случаях развивается критическая ишемия, которая приводит к высоким ампутациям нижних конечностей. И, несмотря, на очевидный прогресс сосудистой хирургии эта проблема остается актуальной.

Цель: определить оптимальную тактику хирургического лечения больных с гангреной нижних конечностей на фоне облитерирующего атеросклероза.

Задачи:

- 1 Определить частоту указанной патологии у пациентов, получавших лечение в хирургическом отделении 5 ГКБ.
- 2 Оптимизировать хирургическую тактику лечения у больных с гангреной нижней конечности.

Материал и методы. Нами ретроспективно были изучены 32 истории болезни пациентов, страдающих критической ишемией нижних конечностей на фоне ОАСНК, получавших лечение во 2 хирургическом отделении 5ГКБ г. Минска в 2014 году.

Результаты и их обсуждение. Количество мужчин от общего числа пациентов составило 78,1%, а женщин - 21,9%. Средний возраст пациентов с данной патологией составил 68 лет. Количество пациентов с влажной гангреной составило 65,6%.

Выводы:

- 1 Частота указанной патологии у пациентов, получавших лечение в 5 ГКБ г. Минска составила 9,76%.
- 2 Для снижения числа ампутаций нижних конечностей на фоне облитерирующего атеросклероза следует проводить диагностику на ранних стадиях развития данного заболевания, на которых еще возможно предотвратить развитие критической ишемии консервативным путем.