

Алехнович В. Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНХРОННЫМИ И МЕТАХРОННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Прохоров А. В.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Синхронное метастатическое поражение печени при колоректальном раке диагностируется у 5% пациентов. Еще у 35 – 45% вторичные метастатические очаги в печени выявляются в последующие годы (преимущественно в первые 3 года).

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с синхронными и метакронными метастазами колоректального рака в печень.

Задачи:

1 Проанализировать показатели выживаемости данной группы пациентов с учетом характера проведенного лечения.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт пациентов с синхронными и метакронными метастазами колоректального рака, взятых на учет в УЗ «МГКОД» в период с 2010г. по 2012г. Проанализированы амбулаторные карты 325 пациентов, из них 136 женщины (42%) и 189 мужчин (58%).

Результаты и их обсуждение. У 247 пациентов с синхронными метастазами колоректального рака в печень проведено лечение в следующем объеме : радикальное хирургическое лечение с нео- и/или адъювантной химиотерапией – в 19% случаев (общая двухлетняя выживаемость составила 40%, при этом без признаков прогрессирования 37%), паллиативное лечение с адъювантной химиотерапией – 42% (медиана выживаемости 10 мес) и симптоматическое хирургическое лечение с адъювантной химиотерапией – 22% (медиана выживаемости 5,5 мес), химиотерапию – 5% (медиана выживаемости 7,5 мес), спечление не проводилось по тем или иным причинам – 11%, отказ от лечения – 1% (медиана выживаемости 2 мес).

При анализе амбулаторных карт 78 пациентов с метакронными метастазами колоректального рака выявлено, что время до прогрессирования после радикального хирургического лечения в среднем составило 13 мес. Радикальное лечение метастазов с нео- и/или адъювантной химиотерапией проводилось в 41% случаев (общая двухлетняя выживаемость составила 69%, при этом без признаков прогрессирования 50%), химиотерапия – в 43% (медиана выживаемости 12 мес), спечление не проводилось по тем или иным причинам – в 15%, отказ от лечения – 1% (медиана выживаемости 5 мес).

Выводы:

1 Результаты лечения пациентов с метастазами колоректального рака в печень являются неудовлетворительными, поэтому необходимо усовершенствование методик радикального хирургического лечения, в том числе РЧА метастазов рака в печень.