

*Воронец А. В.*

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ  
РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ  
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бойко С. Л.*

*Кафедра психологии и педагогики*

*Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно*

**Актуальность.** Органические психические расстройства (ОПР) – расстройства, сгруппированные вместе на основании общей этиологии, заключающейся в церебральных заболеваниях, мозговых травмах или других повреждениях, приводящих к дисфункции. В развитых странах ОПР входят в тройку наиболее распространённой психической патологии.

**Цель:** определить эпидемиологическую обстановку по ОПР среди женского населения Гродненской области за период 2002-2013 гг.

**Задачи:**

1 Выявить ключевые тенденции в динамике показателей заболеваемости и болезненности ОПР.

2 Продемонстрировать значимость проблемы ОПР.

**Материал и методы.** Для анализа заболеваемости и болезненности ОПР за единицу наблюдения был принят каждый случай ОПР среди женского населения в течение 2002-2013 гг. Изучаемый контингент был разделен по возрасту (40-59 лет и старше 60 лет); были рассчитаны специальные интенсивные показатели. Исследование выполнялось при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках темы «Оценка медико-социального бремени органических психических расстройств» (договор №М14М-082 от 23 мая 2014 г.).

**Результаты и их обсуждение.** Средние уровни заболеваемости ОПР у женщин 40-59 лет и после 60 лет составили 207,4 и 696,3, КН по отношению к 2002 году – 78,5 и 146,9, значения абсолютных приростов – -4,86 и 56,84, 1% прироста – 2,07 и 6,6, значения темпа приростов – 2,12 и 10,45, соответственно. Показатели распространенности ОПР характеризовались следующим образом: средние показатели болезненности составили 828,5 и 2598,0 на 100 тысяч населения, КН по отношению к 2002 году – 65,3 и 128,3, значения абсолютных приростов – -49,9 и 118,64, 1% прироста – 8,36 и 25,31, значения темпа приростов – -4,04 и 4,86, соответственно.

**Выводы:**

1 Распространенность ОПР зависит от возраста – наблюдается снижение болезненности и заболеваемости ОПР у женщин 40-59 лет, увеличение – в группе женщин 60 лет и старше.

2 Снижение заболеваемости и болезненности ОПР среди более молодого женского населения области можно расценить как положительную тенденцию.

3 Ежегодный рост числа больных ОПР, по всей вероятности, обусловлен истинным ростом заболеваемости, повышением качества диагностики, расширением возможности реабилитации и терапии.