

Копытов Д. А.

**СЕКСУАЛЬНАЯ СФЕРА И СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС У ЛИЦ
МУЖСКОГО ПОЛА, СТРАДАЮЩИХ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ**

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Доморацкий В. А.

Кафедра психиатрии и медицинской психологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. К факторам, влияющим на злоупотребление алкоголем у мужчин можно отнести особенности половой сферы и семейно-социальный статус, которые в некоторых случаях отрицательно влияют на алкогольное аддиктивное поведение.

Цель: определить особенности сексуальной сферы и удовлетворенность браком у лиц мужского пола, страдающих алкогольной зависимостью (АЗ) для обоснования эффективных профилактических мероприятий.

Материал и методы. Исследованы 408 лиц с АЗ основная группа (ОГ); 161 субъект контрольной группы (КГ) без АЗ. Методики: «Б-ИТА», AUDIT, МКБ-10, шкала векторного определения половой конституции у мужчин, сексуальная формула мужская (СФМ), тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), «Мотивы потребления алкоголя (МПА)».

Результаты и их обсуждение. В ОГ, по сравнению с КГ: более низкие показатели, отражающие уровень «стадии реализации половых намерений», соответственно $8,61 \pm 0,1$ и $9,64 \pm 0,1$ ($p < 0,05$); более низкие показатели, отражающие уровень половой активности, соответственно $7,86 \pm 0,1$ и $8,54 \pm 0,1$ ($p < 0,05$); более низкие уровни прогностического показателя, соответственно $27,3 \pm 0,3$ и $29,8 \pm 0,4$ ($p < 0,05$). Не установлено достоверной разницы между группами в среднегрупповых показателях, отражающих уровень «стадии коопуляции», соответственно $7,53 \pm 0,1$ и $7,58 \pm 0,15$ и удовлетворенностью браком $29,3 \pm 0,7$ и $32,6 \pm 3,1$. Ни в одной из групп нет субъектов значительно или полностью удовлетворенных браком. В ОГ по сравнению с КГ больше удельный вес лиц частично удовлетворенных браком (соответственно, 49,5% и 33,3%). У 72,4% субъектов ОГ прогностический показатель СФМ ниже среднестатистической нормы. В КГ таковых 52,2% ($p < 0,05$). В ОГ имеется корреляционная связь между возрастом начала алкогольных проблем с возрастом, в котором появились семейно-сексуальные дисгармонии ($r=0,6$) и сроком проживания в браке ($r=0,65$).

Выводы: 1) лица из ОГ, по сравнению с субъектами из КГ, более выраженные сексуальные проблемы, преимущественно на стадии реализации сексуальных намерений; 2) в обеих нет субъектов значительно или полностью удовлетворенных браком, а в ОГ больше лиц с частичной его удовлетворенностью; 3) в ОГ больше удельный вес лиц с реальной и мнимой сексуальной патологией; 4) семейно-сексуальные дисгармонии могут быть одной из причин алкоголизации; 5) полученные данные желательно учитывать при проведении профилактических мероприятий при АЗ.