

Козел И. А., Якутович Н. В.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ И ЛОБНОЙ ПАЗУХ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кандрукевич О. В.

3-я кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Тесные анатомо-физиологические связи ЛОР-органов и ротовой полости обуславливают их взаимное влияние друг на друга. Заболевания ЛОР органов, сопровождаясь распространением бактериальной микрофлоры, снижением общего и местного иммунитета, функциональными нарушениями, влекут за собой патологические изменения и в состоянии ротовой полости.

По данным клинических исследований, среди пациентов с различной острой и хронической патологией ЛОР-органов, одними из самых распространенных ЛОР-заболеваний являются синуситы верхнечелюстной и лобной пазух (до 25%).

Цель: изучить стоматологический статус пациентов с острыми синуситами верхнечелюстной и лобной пазух.

Задачи:

1 Изучить и сопоставить стоматологический анамнез и ЛОР-анамнез пациентов с острыми синуситами верхнечелюстной и лобной пазух.

2 Оценить состояние красной каймы губ, слизистой оболочки рта, слюны у пациентов с острыми синуситами верхнечелюстной и лобной пазух.

3 Оценить состояние гигиены рта и тканей периодонта у пациентов с острыми синуситами верхнечелюстной и лобной пазух.

Материал и методы. Анкетирование и стоматологический осмотр пациентов оториноларингологического отделения ГУ «9-я городская клиническая больница»; индексная оценка (индекс Федорова-Володкиной, проба Шиллера-Писарева, тест тягучести и микрокристаллизация слюны).

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования большинство пациентов отмечают преобладание ротового дыхания в период обострения ЛОР-заболевания и, в связи с этим, сухость в полости рта, галитоз, затруднения при чистке зубов, усиление кровоточивости десны. По данным клинического обследования у большинства пациентов выявлена сухость красной каймы губ и слизистой оболочки рта, высокая вязкость слюны, отечность языка, гингивит среднетяжелой степени тяжести, неудовлетворительная гигиена ротовой полости.

Выводы:

1 Выявлена взаимосвязь заболеваний ЛОР-органов с состоянием ротовой полости.

3 При проведении стоматологических лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов необходимо принимать во внимание взаимное влияние ЛОР-патологии и стоматологического статуса пациента.