

*Мельникова М. А.*

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ  
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ  
КЛИНОВИДНЫЕ ДЕФЕКТЫ, В Г. МОГИЛЁВЕ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Гунько Т. И.*

*1-я кафедра терапевтической стоматологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Клиновидные дефекты, по данным ряда авторов, являются одними из наиболее распространенных некариозных поражений зубов. Данная патология встречается у людей различных возрастов. Процесс развития клиновидного дефекта приводит к убыли твёрдых тканей зуба и, как следствие, появлению жалоб пациентов. Своевременное выявление, профилактика и лечение клиновидных дефектов – путь к снижению их развития.

**Цель:** изучить распространенность клиновидных дефектов у различных групп населения и выявить стоматологический статус пациентов, имеющих данную патологию на примере жителей Могилёвской области, обслуживающихся в УЗ МОСП г. Могилёва.

**Задачи:**

- 1 Установить частоту встречаемости клиновидных дефектов зубов у пациентов, обслуживающихся в УЗ МОСП г. Могилёва
- 2 Определить частоту поражаемости различных групп зубов у лиц с клиновидными дефектами.
- 3 Выявить стоматологический статус пациентов, имеющих данную патологию.

**Материал и методы.** Было осмотрено 120 пациентов, обслуживающихся в УЗ МОСП г. Могилёва.

**Результаты и их обсуждение.** В результате обследования были выявлены клиновидные дефекты во всех возрастных группах, определена частота поражаемости различных групп зубов, определен стоматологический статус пациентов, имеющих клиновидные дефекты.

**Выводы:**

- 1 Стоматологический осмотр пациентов, обслуживающихся в УЗ МОСП г. Могилёва, показал, что клиновидные дефекты выявляются у 16,25 % числа осмотренных лиц.
- 2 Распространенность клиновидных дефектов наименьшая в молодом возрасте. Стоматологический статус незначительно влияет на развитие данной патологии.