

Песецкая Ю. Л.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Кандрукевич О. В.

3-я кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Лечение пациентов с гипертонической болезнью включает постоянный прием лекарственных препаратов. Прием лекарственных средств в ряде случаев сопровождается изменениями со стороны органов и тканей ротовой полости.

Цель: установить влияние гипотензивной лекарственной терапии на стоматологическое здоровье пациентов с гипертонической болезнью.

Задачи:

1 Проанализировать данные медицинской литературы о возможном влиянии гипотензивных препаратов на стоматологическое здоровье пациентов.

2 Изучить стоматологический статус пациентов с гипертонической болезнью, принимающих гипотензивные препараты.

Материал и методы. Проведено анкетирование и стоматологический осмотр 30 пациентов, регулярно принимающих гипотензивные лекарственные препараты. Исследовали рН, микрокристаллизацию, тягучесть ротовой жидкости.

Результаты и их обсуждение. При анкетировании и стоматологическом обследовании чаще всего отмечали: сухость в ротовой полости; кровоточивость десны при зондировании и чистке зубов; неприятный запах изо рта; белый налет на языке. Лабораторные исследования показали, что рН ротовой жидкости находится в пределах 6-7ед. Тест тягучести ротовой жидкости дал отрицательный и резко отрицательный результаты. Микрокристаллизация слюны по III типу.

Выводы:

1 Гипотензивная лекарственная терапия является фактором, оказывающим влияние на стоматологический статус пациентов с гипертонической болезнью.

2 Полученные данные следует принимать во внимание при планировании лечебно-профилактических стоматологических мероприятий у пациентов с гипертонической болезнью, принимающих гипотензивные препараты.