

*Ткачѳв И. Б., Шарников Д. А.*

## **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ОКС С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН**

*Научные руководители: ассист. Оберемок С. Е., ассист. Шульженко А. В.*

*Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи  
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»,  
г. Луганск*

**Актуальность.** Острая коронарная патология занимает одну из лидирующих позиций среди сердечно - сосудистых заболеваний. Рассматривая зависимость возникновения острого коронарного синдрома у людей различных полов необходимо выявить закономерность развития острого коронарного синдрома (ОКС) у мужчин и женщин.

**Цель:** провести анализ частоты возникновения ОКС с подъемом сегмента ST у мужчин и женщин, и выявить закономерность развития у различных групп людей, разделенных по половому признаку.

**Материалы и методы.** Проведено исследование развития острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST у лиц различного пола 2014 - 2016 гг. на догоспитальном этапе. База проведения исследования ГУ «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Возраст и статус пациентов не являлись определяющими.

**Результаты и их обсуждения.** За период изучения из 98 пациентов, перенесших ОКС с элевацией сегмента ST отмечается, что заболевание возникло у 74 мужчин (75 %) и 24 женщин (25%), причем, независимо от пола, преимущественно встречается поражение передней стенки левого желудочка.

**Выводы.** Проведенный анализ выявил, что частота развития ОКС с подъемом сегмента ST у лиц женского пола встречается чаще в 3 раза, чем у мужчин. Также отмечается преимущественная локализация поражения передней стенки левого желудочка.