

*Логовая Е. Н., Куфтина Е. А.*  
**СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ  
ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ**

*Научный руководитель ассист. Антонова Н. П.*

*Кафедра фтизиопульмонологии*

*Белорусский государственный медицинский университет г. Минск*

**Актуальность.** Туберкулез занимает одно из лидирующих мест в структуре причин смерти от инфекционных болезней. Для развития туберкулеза необходимо наличие интенсивной антигенной нагрузки и (или) ослабления защитных сил организма, что наблюдается, как правило, при наличии сопутствующей патологии, среди которой уже выделена значимость ВИЧ-инфекции. Любая тяжелая болезнь может не только снижать иммунитет, но и служить причиной смерти, что практически не анализируется в литературе.

**Цель:** анализировать структуру причин смерти пациентов фтизиатрических отделений.

**Задачи:**

- 1 Определить структуру форм туберкулеза, приведших к летальному исходу.
- 2 Определить роль сопутствующей патологии в структуре причин смерти в различных возрастных группах.

**Материал и методы.** Ретроспективный анализ 130 историй болезни пациентов, умерших в период 2009 – 2013 гг. в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».

**Результаты и их обсуждение.** Туберкулез являлся непосредственной причиной смерти у 55,33% пациентов (казеозная пневмония 41,84%, диссеминированный туберкулез 24,11%, фиброзно-кавернозный 19,86%, менингиты 8,67% и прочее 5,52%; МЛУ 85,3%, ШЛУ 14,67%). Причиной смерти сопутствующая патология являлась у 44,67% пациентов: из них заболевания сердечно – сосудистой системы 69,65%; онкологические заболевания 10%; хронический алкоголизм 8%; ВИЧ-инфекция 9,34%; прочее 3,01%; МБТ«+»87,34%, МБТ«-»12,66%.

**Выводы:**

- 1 Среди причин смерти 55,33% приходится непосредственно на туберкулез.
- 2 44,67% это сопутствующие заболевания, которые отразились на тяжести состояния пациентов.
- 3 В структуре причин смерти с сопутствующей патологией лидируют заболевания сердечно – сосудистой системы 69,65%.