

*Писаренко Г. Н.*

**ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ  
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ**

*Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Гринченко С. В.*

*Кафедра общей хирургии №2*

*Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков*

**Цель:** изучение осложнений при абдоминопластике вследствие многих факторов, способствующих возникновению и развитию вентральных грыж.

**Материал и методы.** Материалом послужило изучение 150 историй болезни больных возрастом от 30 лет до 68 года за 2005-2012 года с вентральными грыжами (мужчин – 55, женщин - 69). В работе применялся метод УЗИ, исследования крови, бактериологические методы.

**Результаты и обсуждение.** В результате проведенных исследований установлено, что основными факторами развития вентральных грыж являлись нарушение гомеостаза, общий дефицит сывороточного белка, интоксикация. Также фактором развития грыж являлись действия хирурга: несовершенство хирургической техники, использование быстро рассасывающегося шовного материала. Проведя гистологическое исследование нельзя не учесть образование гематом (14,7% - 19 человек), сером (71% - 92 чел.) и тальковых гранул (1,3% - 19 чел.) в ране. При применении onlay - техники вследствие пересечения множества лимфатических и кровеносных капилляров чаще возникает скопление серозной жидкости. При inlay - технике происходят случаи отделения апоневротических и фасциальных листков от мышц и расслоение самих мышц.

**Выводы:**

1 Таким образом, нами установлена взаимосвязь между способами грыжепластики и их осложнениями, что дает возможность предвидеть возможные осложнения и предотвратить их, а также улучшить качество проведения абдоминопластики вентральных грыж, уменьшить количество их осложнений и инвалидизацию пациентов.