

*Ромашко М. С.*

## **ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОРОДАВКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД С 2006 ПО 2016 ГОД**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л.*

*Кафедра кожных и венерических болезней*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Одной из значимых, широко распространенных и недостаточно изученных нозологических форм в структуре ИППП, являются венерические бородавки (ВБ). Они характеризуются длительным хроническим рецидивирующим течением, торпидностью, высокой контагиозностью, большим количеством носителей, низкой выявляемостью. Согласно современным научным воззрениям, ВПЧ часто выступает как кофактор онкологических заболеваний.

**Цель:** изучить возрастную-половую характеристику заболеваемости венерическими бородавками в Республике Беларусь за 2006-2016 годы.

**Материалы и методы.** В качестве материалов в работе использованы данные государственной статистической отчетности кожно-венерологической службы: форма №1-ИППП за 2006-2016 гг. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики.

### **Результаты и их обсуждение.**

Была изучена динамика заболеваемости ВБ в целом по Республике Беларусь за 2006-2016 годы. За данный период, наблюдались колебания заболеваемости ВБ с тенденцией к снижению. Однако, удельный вес заболеваемости данной патологией среди всех ИППП значительно возрос (в 7 раз) и составил в 2016 г. – 10,24% (в 2006 г. - 1,47%). Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался в 2011 г., когда число заболевших ВБ на 100 тыс. населения составило 38 человек. Среди регионов показатель достиг максимума в Могилевской области в 2007 г. – 49 человек на 100 тыс. населения.

При изучении возрастно-половых особенностей заболеваемости ВБ за данный промежуток времени, выяснилось, что женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще мужчин. Самыми уязвимыми к данной инфекции оказались лица в возрасте 20-24 лет. Их удельный вес, среди всех больных ВБ, составил 36%.

Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что заболеваемость населения трихомониазом, была в 3 раза выше, чем заболеваемость ВБ, в то же время хламидиоз встречался в 2,3 раза чаще, заболевания, обусловленные *Mycoplasma genitalium* в 2 раза чаще. Заболеваемость ВБ, в свою очередь, превышала заболеваемость сифилисом в 4 раза, генитальным герпесом в 2 раза, гонококковой инфекцией в 1,5 раза.

### **Выводы.**

В течение 2006-2016 гг. наблюдались колебания заболеваемости ВБ с тенденцией к снижению заболеваемости. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике Беларусь наблюдался в 2011 году (38 человек на 100 тыс. населения). Женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще мужчин. Самой уязвимой к ВБ возрастной группой был возраст 20-24 года. При сопоставлении уровня заболеваемости различными ИППП в 2016 году по Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость среди населения трихомониазом, была в 3 раза выше, чем заболеваемость венерическими бородавками. Заболеваемость ВБ, в свою очередь, превышала заболеваемость сифилисом в 4 раза.