

*Соколова М. А.*

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
Г. КУРСКА ЗА ПЕРИОД 2013-2014 ГГ.**

*Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Новикова Е. А.*

*Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии*

*Курский государственный медицинский университет, г. Курск*

**Актуальность.** Результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний, особенно кариозного происхождения, среди населения России достаточно высока. Осложнения кариеса представляют собой серьезную опасность для здоровья людей, прежде всего, тем, что требуют хирургического вмешательства, которое в любом случае рискованно, отрицательно влияют на общее самочувствие, а также могут привести к возникновению гранулемы, кисты и злокачественной опухоли.

**Цель:** проанализировать распространенность осложнений кариеса (пульпита и периодонтита) среди взрослого населения города Курска за период исследования 2013-2014 гг.

**Задачи:**

3 Оценить распространенность осложнений кариеса (пульпита и периодонтита).

4 Проанализировать динамику встречаемости пульпита и периодонтита.

**Материал и методы исследования.** Материалом для настоящего исследования послужили данные сводной ведомости работы врачей отделения терапевтической стоматологии ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника» за 2013 и 2014 годы. При обработке показаний были использованы методы стандартной статистики.

**Результаты и их обсуждение.** За исследуемый период было зарегистрировано 14075 обращений по поводу осложнений кариеса в 2013 году, 12138 – в 2014 году, что составляет, соответственно, 50% и 53% от общего числа принятых больных. Значение критерия Стьюдента были ниже допустимых значений. Статистически значимых различий не выявлено.

**Выводы:**

1 Осложнения кариеса являются наиболее часто встречаемыми нозологическими единицами стоматологических заболеваний, что может быть связано с отсутствием обращения за помощью при кариесе, дальнейшем развитии воспалительного процесса до пульпита и периодонтита, которые обычно сопровождаются более выраженными симптомами (пульпит).

2 Анализ динамики встречаемости осложнений кариеса показал, что абсолютные значения снизились, однако процентный показатель распространенности по отношению ко всем стоматологическим заболеваниям возрос на 3%, что, возможно, обусловлено недостаточной информированностью населения о развитии осложнений кариеса