

*Белинский Б. О.*

**ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСОРИАЗА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ст. преп. Соколовская И. А.  
Кафедра общей гигиены и экологии Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина*

**Актуальность.** Псориаз (чешуйчатый лишай) – наиболее распространенное хроническое, часто рецидивирующее, системное полигенное заболевание. В настоящее время псориаз считается мультифакториальным заболеванием, в генезе которого играет роль как наследственный фактор, так и многочисленные факторы внешней среды.

**Цель:** изучить особенности заболеваемости псориазом в условиях влияния загрязнения атмосферного воздуха.

**Задачи:**

1 Изучить особенности заболеваемости псориазом в промышленном регионе на основании социально-гигиенического мониторинга.

**Материал и методы.** Для оценки комплексного влияния факторов среды использован подход, в основе которого лежит сопоставление среднерайонных характеристик отдельных ее факторов с соответствующими среднерегionalными показателями, принимаемыми за стандарт (эталон).

**Результаты и их обсуждение.** Наиболее высокие уровни распространенности псориаза в Запорожской области зарегистрированы в г. Запорожье, Гуляйпольском, Веселовском, Куйбышевском, Приморском и Васильевском районах. В указанных административных единицах распространенность псориаза находилась в пределах 269,6 – 513,8 сл./100 тыс.

**Выводы:**

1 Для достижения стойкой ремиссии у пациентов с псориазом обязательно осуществлять коррекцию экзогенных и эндогенных триггерных факторов с целью минимизации их воздействия.

2 Материалы социально-гигиенического мониторинга заболеваемости псориазом Запорожской области целесообразно использовать для разработки управленческих решений по охране воздушного и водного бассейна от техногенного загрязнения.