



# *Дифференциально-диагностическое значение свойств рвотной массы*

- **Запах:** кислый запах и кислая реакция на лакмус указывает на рвоту из желудка, а не из пищевода; тухлый запах указывает на процессы гниения.
- **Примесь слизи:** является признаком гастрита или может появляться при проглатывании мокроты при ОРИ.
- **Примесь желчи:** характерна для рвоты из 12-перстной кишки, наблюдается при стенозе 12-п. кишки ниже места впадения общего желчного протока.
- **Примесь крови и каловый запах** – признак кишечной непроходимости с низко расположенным стенозом кишки.
- **Пенистый вид** – характерен для отравления моющими средствами, ПАВами

# Дифференциально-диагностическое значение примеси крови в рвотной массе

- *У новорожденных и детей первых месяцев жизни* примесь крови может быть обусловлена попаданием крови из родовых путей, из трещин соска матери (*мелена ложная*) или гипопротромбинемией (недостатком витамина К) (*мелена истинная*)
- *Во все периоды жизни* причиной примеси крови в рвотных массах могут быть:
- заболевания крови (тромбоцитопения и тромбоцитопатия, лейкоз и панмиелопатия, гемофилия, геморрагический васкулит)
- кровотечения из дыхательных путей (из носа, кровохарканье)
- кровотечения из разных отделов ЖКТ: из десны, из миндалин, из глотки, варикоз вен пищевода, инородное тело пищевода, ожог пищевода, эзофагит, язва пищевода и желудка, гипертрофический пилоростеноз, язва 12-перстной кишки

**Причинами рвоты могут быть: острые инфекции, интоксикации, заболевания органов пищеварения, нарушения метаболизма, поражения разных органов и систем**

- Рвота является симптомом таких *инфекций* как *менингиты, острые кишечные инфекции, скарлатина, коклюш* и др.
- *Нарушения метаболизма*, протекающие с синдромом рвоты: галактоземия, фенилкетонурия, гипераммониемия, синдром циклической рвоты, нервно-артритическая аномалия конституции и др.
- *Заболевания нервной системы*: черепно-мозговая травма, опухоли ЦНС, мигрень, вегетативные кризы, вестибулярные нарушения, нервная анорексия, насильственное кормление младенцев
- Солнечный и тепловой удар, лекарственная интоксикация (в т.ч. суицид)

## Наиболее частые заболевания, протекающие с синдромом рвоты, в зависимости от возраста:

- *У детей от 0 до 3 лет:* пороки развития (атрезия, стеноз, дивертикул пищевода); недостаточность кардиального отдела желудка; врожденный пилоростеноз; врожденная и приобретенная кишечная непроходимость; ахалазия; пищевая непереносимость, врожденная патология ЦНС, ГЭРБ, тяжелая сопутствующая патология (сепсис, органная недостаточность).
- *У детей от 3 до 6 лет:* воспалительные заболевания инфекционного (нейроинфекции, ОКИ) и неинфекционного генеза ЖКТ и других систем организма; инородные тела ЖКТ.
- *У детей от 6 до 18 лет:* отравления токсическими веществами, психогенные расстройства, эндокринная патология, беременность, повышение внутричерепного давления, лабиринтит, мигрень, травмы.

***Рвота при менингите*** – имеет центральный генез. Возникает при поражении головного мозга и его оболочек, не связана с приемом пищи, не сопровождается предшествующей тошнотой, не облегчает состояние больного.

Триада симптомов ***при менингококковом менингите***: головная боль, менингеальный синдром, стойкая гипертермия.

- ***Однократная рвота*** в период манифестации болезни – при скарлатине, роже;
- ***Рвота, связанная с приступом кашля*** – при коклюше, тяжелом течении трахеита.
- ***Рвота при ОКИ, пищевых отравлениях*** – длительная, упорная, обычно ей предшествует тошнота.
- ***Рвота по утрам*** чаще связана с внутричерепной гипертензией, опухолями ЦНС.