

*Антоненкова Н. Н., Моисеев П. И., Машевский А. А., Якимович Г. В.*

**ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ:  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ**

*Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь*

В Беларуси смертность от злокачественных новообразований (ЗН) среди всех причин смерти занимает второе ранговое место, что отражается на средней продолжительности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, особенно в трудоспособном возрасте, а также наносит значительный экономический ущерб.

**Цель:** эпидемиологическая характеристика онкологической заболеваемости, смертности и оценка невосполнимых трудовых потерь в Беларуси.

**Материалы и методы.** Использованы данные Белорусского канцер-регистра за 2004-2013 гг.; методы — статистические, эпидемиологические.

**Результаты и обсуждение.** В 2013 г. зарегистрировано 44 010 случаев заболеваний ЗН с впервые установленным диагнозом. Из всех заболевших пациентов 33,1 % мужчин и 25,3 % женщин находились в трудоспособном

возрасте. За 2004-013 гг. показатели заболеваемости (на 100 тыс. населения) увеличились: интенсивный — на 22,2 %, стандартизованный (мировой стандарт) — на 12,3 %.

В последнее десятилетие в стране наблюдается тенденция к снижению смертности от некоторых форм ЗН: у мужчин — от рака желудка, прямой кишки, мочевого пузыря, почки, легкого, гортани, лейкозов и лимфом Ходжкина; у женщин — от рака желудка, прямой кишки, легкого, молочной железы, шейки и тела матки и яичника. Вместе с тем проблема смертности населения от ЗН является первостепенной для онкологической службы. В 2013 г. в стране от ЗН умерли 16 558 человек, из них 26,9 % находились в трудоспособном возрасте.

Потери трудового потенциала являются наиболее удобной единицей измерения ущерба или потерь от любых проявлений нездоровья (заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности) и измеряются в человеко-годах.

Проведен расчет и анализ потерянных лет потенциальной жизни среди пациентов со ЗН основных локализаций, умерших в трудоспособном возрасте в Беларуси в 2004-013 гг. В качестве критерия «дожить до определенного возраста» принят возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Количество потерянных лет потенциальной жизни, связанных со смертью от ЗН, у мужчин трудоспособного возраста в 2013 г. составило 26 570, у женщин — 11 505. Наибольшие невосполнимые трудовые потери отмечены у мужчин 50-54 лет и у женщин 45-49 лет. В структуре общих потерь человеко-лет жизни от ЗН у мужчин трудоспособного возраста первые места занимают опухоли легкого (19,6 %), желудка (10,9 %), полости рта и глотки (10,8 %), у женщин — опухоли молочной железы (18,7 %), шейки матки (15,3%), желудка (9,5 %).

**Выводы.** В Беларуси отмечается рост онкологической заболеваемости. ЗН являются одной из важнейших причин, влияющих на величину невосполнимых социальных потерь, особенно среди трудоспособного населения. Качественная и количественная оценка социальных потерь от ЗН позволяет целенаправленно использовать их при планировании противораковых мероприятий, направленных на снижение потерь здоровья населения.