

Анализ заболеваемости острой и хронической формами вирусного гепатита с и фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств направленного действия для лечения данного заболевания

Халилов Арсений Муслимович

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – научный сотрудник Шилова Маргарита

Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Инцидентность вирусного гепатита С (ВГС) в Республике Беларусь растет с каждым годом. Заболеваемость хронической формой ВГС в 2017 г. составила 33,580/0000, а острой – 0,700/0000. Этому способствуют различные факторы: распространенность инъекционной наркомании, несвоевременно назначенное и, в ряде случаев, неэффективное лечение, высокая стоимость лекарственных средств ВГС на территории Республики Беларусь, малосимптомная клиническая картина острой формы заболевания и др. В связи с вариабельностью генома ВГС у лиц, перенесших инфекционный процесс, не вырабатывается специфическая невосприимчивость к повторным заражениям. Установлена возможность множественного инфицирования различными генотипами и субтипами возбудителя.

Цель исследования

Выявить и проанализировать особенности проявления эпидемического процесса ВГС в Республике Беларусь за 2016 и 2017 гг., а также проанализировать современные подходы к безинтерфероновой терапии ВГС.

Материалы и методы

Использовались данные форм официального учета и регистра-ции заболеваемости острой и хронической формами ВГС в Республике Беларусь. Основа методологии – наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса ВГС с использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Был проведен фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств направленного действия для терапии ВГС. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе MicrosoftExcel 7.

Результаты

С 2002 по 2017 гг. инцидентность хронической формы ВГС в Республике Беларусь стремительно растет. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил $23,61 \pm 0,560/0000$. Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. – $31,68 \pm 0,580/0000$ и отличается от фактического показателя (33,580/0000) на 5,66%. Заболеваемость острой формой ВГС за 2002-2017 гг. имеет обратную направленность. Среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Беларусь составил $0,96 \pm 0,10/0000$. Показатель заболеваемости на 2017 г. составил 0,70 0/0000 и лежит в диапазоне прогнозируемого показателя заболеваемости ($0,78 \pm 0,090/0000$). Современные подходы к терапии хронического ВГС основаны на применении лекарственных средств направленного действия, показавших высокую эффективность в достижении УВО.

Выводы

В течение 2002-2017 гг. инцидентность хронической формы ВГС в Республике Беларусь стремительно растет и в 2017 г. составила 31,680/0000. Заболеваемость острой формой ВГС снижается и в 2017 г. составила 0,700/0000. Применение лекарственных средств направленного действия позволяет достичь значительную эффективность не только в составе комплексной терапии, но и в качестве монопрепаратов.