

Проявления эпидемического процесса вирусного гепатита с в республике беларусь

Акулинская Анастасия Ивановна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент **Бандацкая Майя Ивановна**, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

Введение

Вирусный гепатит С (ВГС) в большинстве случаев протекает без явных клинических признаков поражения печени (желтухи) и остается незамеченным. Это приводит к учащению хронизации инфекции, а также к осложнениям со стороны печени, малигнизации. Стоит вопрос диагностики и терапии острой формы инфекции (ОВГС) среди детского населения в связи с ростом выявления хронической формы (ХВГС). Так как источником инфекции может быть не только больной манифестной формой, но и бессимптомной, заражение возможно при медицинских и иных манипуляциях, где есть контакт с кровью.

Цель исследования

Выявить особенности проявлений эпидемического процесса ВГС в Республике Беларусь.

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили данные официальной регистрации заболеваемости ВГС в Республике Беларусь с 2002 по 2017 гг. Нами проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование.

Результаты

В 2017 г. в Беларуси выявлено 66 больных ОВГС и 3151 больной ХВГС. В 2002-2017 г. показатели заболеваемости ОВГС находились в пределах от 0,63 в 2009 г. до 1,81 на 100 000 населения в 2002 г. Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со средним темпом убыли 4,1%. Показатели заболеваемости ХВГС колебались от 15,51 в 2003 г. до 33,58 на 100 000 населения в 2017 г. Многолетняя динамика характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним темпом прироста 4,8%. При этом многолетняя динамика инцидентности носителей ВГС характеризовалась выраженной тенденцией к снижению со средним темпом убыли 8,9%. Это связано с изменением критериев постановки диагноза ХВГС и носитель ВГС. В целом динамика инцидентности хронических форм инфекции (больные ХВГС и носители) характеризовалась умеренной тенденцией к снижению. Средний темп убыли составил 3,2%.

В 2017 г. ОВГС регистрировался только у взрослых. Самые высокие показатели заболеваемости регистрировались в Витебской области (1,33 на 100 000) и г.Минске (1,02 на 100 000), а самые низкие – в Гродненской области (0,29 на 100 000).

ХВГС в 2017 г. регистрировался во всех возрастных группах. 99,1% заболевших составили взрослые. Из детского населения самые высокие показатели заболеваемости были в группе детей 0-2 лет (4,58 на 100 000) и 14-17 лет (2,20 на 100 000). Больше всего больных подростков выявлено в Могилевской области. Самые высокие показатели заболеваемости ХВГС были в г. Минске (57,92 на 100 000) и Могилевской области (51,02 на 100 000).

Выводы

В Беларуси отмечается умеренная тенденция к снижению заболеваемости ОВГС и хроническими формами ВГС. При этом растет число больных ХГС и уменьшается число носителей. ВГС регистрируется преимущественно среди взрослых. Территориями риска являются г.Минск, Могилевская и Витебская области.