

Проблема сопутствующей патологии во фтизиатрии

Юшук Дарья Александровна, Филипченко Александр Игоревич

Белорусский государственный университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский государственный университет, Минск

Введение

Сопутствующая патология (СП) в основном рассматривается в качестве фактора риска развития туберкулеза, остальные аспекты проблемы освещаются комплексно в меньшей мере.

Цель исследования

Изучение различных аспектов проблемы СП во фтизиатрии, ее вклада в развитие, течение и исходы специфического процесса.

Материалы и методы

Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, завершивших интенсивную фазу в стационаре в течение года (1 группа) и умерших во фтизиатрических отделениях РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии за 5 лет (2 группа).

Результаты

Сопутствующая патология (СП) имела место у 39,6% пациентов в группе выписанных из стационара и практически у всех в группе, где не удалось избежать летального исхода. Структура СП у выписанных пациентов выглядела следующим образом: 15,1% составляли болезни системы кровообращения; 7,5% – болезни нервной системы; 8,6% – болезни ЖКТ; 5,7% – сахарный диабет (СД); 2,1% – ВИЧ; 5,0% – болезни почек; 3,9% - болезни органов дыхания; 2,9% - онкологические заболевания; 8,6% – прочие заболевания.

Сопутствующая патология (СП) имела место у 39,6% пациентов в группе выписанных из стационара и практически у всех в группе, где не удалось избежать летального исхода. Структура СП у выписанных пациентов выглядела следующим образом: 15,1% составляли болезни системы кровообращения; 7,5% – болезни нервной системы; 8,6% – болезни ЖКТ; 5,7% – сахарный диабет (СД); 2,1% – ВИЧ; 5,0% – болезни почек; 3,9% - болезни органов дыхания; 2,9% - онкологические заболевания; 8,6% – прочие заболевания.

Выводы

Наличие сопутствующей патологии затрудняет своевременное выявление туберкулеза, способствует неблагоприятному течению специфического процесса и значительно затрудняет проведение полноценного курса лечения за счет развития нежелательных реакций на лекарственные средства.