

*Обухович О. П., Третьяков Д. С.*  
**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛОСТОМИИ**  
*Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Попков О. В.*  
*Кафедра общей хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Стома(anus inter naturalis) — это проход, искусственно наложенный хирургическим путем на проксимальный отдел кишки для постоянного или временного отведения его содержимого от дистального отдела. Согласно данным учета стомийного кабинета Минского городского колопроктологического центра, в настоящее время в Республике Беларусь стремительно растет число стомированных пациентов. Одной из причин данного факта является рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Перечисленные выше факты подчеркивают актуальность данной работы.

**Цель:** изучение факторов, приводящих к операциям по наложению стомы, а также выявление основных причин проведения операции стомирования.

**Материалы и методы.** Выборочно изучены истории болезней 136 пациентов, проходивших курс лечения в Минском городском колопроктологическом центре в период с 2014 по 2016 год. Статистическая обработка проводилась в программе IBM SPSS Statistics 20.0.

**Результаты и их обсуждение.** В результате ретроспективного анализа историй болезни определены наиболее частые показания к проведению операции, среди них первое место занимает дивертикулярная болезнь (42,2%). На втором месте – рак сигмовидной кишки (15,6%). Третье место занимает болезнь Крона (7,8%). Выявлено, что наиболее распространена операция по наложению сигмостомы (57,7%). На втором месте – операция по наложению илеостомы (21,4%), на третьем месте – операция по наложению трансверзостомы (11,38%). Чаще операция по стомированию проводилась пациентам мужского пола (57,14% мужчин и 42,86% женщин). Средний возраст прооперированных пациентов составил  $59,6 \pm 14,8$  лет. Кроме того, изучено возрастное распределение пациентов: 18,7% пациентов в возрасте до 45 лет (молодые), 29,3% - до 60 лет (среднего возраста), 35,0% - до 75 (пожилые), 17,0% - 90 (старческого возраста).

**Выводы.**

1. Среди основных показаний к проведению операции первое место занимает дивертикулярная болезнь.
2. Наиболее часто выполняется операция по наложению сигмостомы, т.к. дивертикулярная болезнь чаще встречается в сигмовидной кишке.
3. Операция стомирования чаще проводится пациентам мужского пола в связи с более высокой предрасположенностью мужчин к колоректальному раку.
4. Операция стомирования чаще всего проводится людям пожилого и старческого возраста в связи с ростом заболеваемости колоректальным раком у данной категории пациентов.