

Вабищевич Ю. Э.
РЕЗИСТЕНТНЫЕ И РЕЦИДИВНЫЕ ФОРМЫ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА
Научный руководитель: ассист. Корень Т. А.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Лимфома Ходжкина – злокачественное новообразование лимфоидной ткани, встречающееся у лиц разных возрастных групп, причем наиболее часто отмечается у лиц в возрасте от 15 до 34 лет. Интенсивный показатель заболеваемости лимфомой Ходжкина в РБ в 2015г. составил 2,9 на 100000, а смертность 0,8 на 100000.

Цель: изучить частоту рецидивных и резистентных форм лимфомы Ходжкина, их зависимость от морфологической формы и стадии заболевания, особенности лечения и выживаемость этих групп пациентов.

Материалы и методы. Проведен анализ выписок из медицинской документации 310 первичных пациентов с лимфомой Ходжкина, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД в 2010-2015 годах. Обработка данных осуществлялась с использованием пакетов компьютерных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. Из 310 пациентов с лимфомой Ходжкина, поставленных на учет в 2010-2015 годах, у 22,3% (n= 69) выявлены резистентные к стандартным схемам лечения и рецидивные формы, в 14,8% (n = 46) резистентные формы заболевания, а в 7,4% (n=46) наступили рецидивы болезни в разные сроки после завершения радикального лечения. В этих группах пациентов использовалась химиотерапия 2-3 линии, а также высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток у 35, которая позволила 46,4 % пациентов войти в состояние ремиссии.

Выводы.

1. Первой линией химиотерапии у пациентов с лимфомой Ходжкина являлась схема ABVD, а 2 линией - BEACOPP.
2. Частота резистентных к стандартным схемам лечения пациентов составляет 14,8%, а рецидивы возникли у 7,4%.
3. Наиболее часто при рецидивных и резистентных формах заболевания имела место 2 стадия заболевания и морфологический вариант НС.
4. Использование высокодозной химиотерапии с трансплантацией стволовых клеток привели к ремиссии у пациентов с резистентными и рецидивными формами лимфомы Ходжкина в 45,9 % случаев.
5. Смертность в изучаемых группах составила 28,3% при резистентных формах и 34,8% при рецидивах заболевания.