

Тактика врачей-стоматологов республики беларусь при консервативном эндодонтическом лечении

Саид Омар Абдулрахман, Бантюкова Дарья Алексеевна

Белорусский государственный медицинский университет, МИНСК

Научный(-е) руководитель(-и) Доктор медицинских наук Профессор Манак Татьяна Николаевна, Бутвиловский Александр Валерьевич Белорусский государственный медицинский университет, МИНСК

Введение

Консервативное эндодонтическое лечение – это лечение глубокого кариеса дентина / гиперемии пульпы / пульпита, направленное на ликвидацию очага воспаления в тканях пульпы с сохранением ее жизнеспособности. Преимуществом консервативного эндодонтического лечения, вне сомнения, является сохранение зуба витальным. К недостаткам можно отнести необходимость высокочувствительной диагностики с использованием дополнительных методов и их точной интерпретации.

Цель исследования

изучить тактику врачей-стоматологов РБ при консервативном эндодонтическом лечении.

Материалы и методы

Проведено анкетирование 150 врачей-стоматологов г. Минска с использованием специально разработанной анкеты, включающей 15 вопросов. Полученные данные обработаны статистически.

Результаты

Большая часть респондентов – сотрудники бюджетных отделений государственных стоматологических поликлиник (71,3%), стоматологи-терапевты (96,4% опрошенных). 94,2% респондентов знакомы с термином «консервативная эндодонтия», 64,2% используют консервативные методы эндодонтического лечения в повседневной практике. При этом, 70,7% опрошенных не всегда уверены в выставлении диагноза при консервативном эндодонтическом лечении. 80% и 94,2% опрошенных используют соответственно прямое и не прямое покрытие пульпы с целью сохранения ее жизнеспособности. В то же время, биологический метод и частичную пульпотомию использует достоверно меньшая часть респондентов (12%). Меньшая часть опрошенных использует лучевую диагностику Bitewing при консервативном эндодонтическом лечении (25%). В качестве лечебной прокладки большая часть респондентов использует Са-содержащие пасты (95,5%).

Выводы

1. Опрошенные стоматологи предпочитают прямое и не прямое покрытие пульпы как методы консервативного эндодонтического лечения. 2. 64,2% респондентов используют консервативные методы эндодонтического лечения в повседневной практике. 3. В качестве лечебных прокладок большая часть опрошенных использует Са-содержащие пасты.