

Редкие осложнения алкогольной болезни

Пилипчук Николай Владимирович

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Недзьведь Михаил Константинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Важной медико-социальной проблемой нашего времени является злоупотребление спиртным. В 30% случаев смерть в трудоспособном возрасте вызвана пагубным употреблением алкоголя. В связи с несвоевременным обращением за медпомощью алкогольная зависимость диагностируется в поздней стадии, когда патологические изменения органов, связанные с хронической алкогольной интоксикацией, бывают выражены в значительной степени.

Цель исследования

Проанализировать протоколы вскрытий и подробно рассмотреть наиболее редкие осложнения алкогольной болезни.

Материалы и методы

Проанализированы 112 протоколов вскрытий умерших в УЗ «Березовская ЦРБ им. Э. Э. Вержбицкого» от осложнений той или иной формы алкогольной болезни в возрасте от 30 до 65 лет.

Результаты

Из 112 протоколов вскрытий были выбраны 15 с наиболее редкими осложнениями алкогольной болезни: гангрена легкого (2 случая), абсцесс легкого (2 случая), алкогольный жировой гепатоз (5 случаев), алкогольный панкреатит (2 случая), панкреонекроз (2 случая), синдром Меллори-Вейса (желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром) (2 случая). В ходе исследования были изучены снимки макропрепаратов пораженных органов, а также их микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином.

Выводы

По итогам исследования наиболее часто алкогольным поражением органов страдают мужчины. Самой распространённой формой алкогольной болезни является жировой гепатоз. Средний возраст умерших от редких осложнений этой патологии составляет 47 лет.