

Реконструктивно-пластические операции как метод коррекции последствий хирургического лечения пациенток с раком молочной железы

Аленникова Полина Сергеевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мороз Елена Геннадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Рак молочной железы (РМЖ) занимает второе место в Республике Беларусь и первое место в мире в структуре онкозаболеваемости у женщин. Количество пациенток больных раком молочной железы с каждым годом увеличивается. Основным радикальным методом его лечения до сих пор остается оперативное вмешательство, которое помогает не только сохранить физическое здоровье женщины, но и нарушает её психологическое состояние своими калечащими последствиями, одним из способов борьбы с которыми являются реконструктивно-пластические операции.

Цель исследования

Определить варианты реконструктивно-пластических операций, сроки их выполнения, наличие послеоперационных осложнений, удовлетворенность пациенток результатами.

Материалы и методы

В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ стационарных карт 140 пациенток с диагнозом РМЖ, проходивших лечение в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в 2016 году. Статистическая обработка данных проведена с использованием прикладных программ « Microsoft Office Excel 2010 » и « Statistika 10.0 ». Дополнительно проведено анкетирование.

Результаты

По результатам исследования было сформировано 6 исследуемых групп. 1-я группа: 70 пациенток, проведена мастэктомия по MADDEN, из них 3 с первичной реконструктивной маммопластикой с использованием TRAM- лоскута, 9 с отсроченной реконструктивной маммопластикой в 2017 году с использованием эндопротеза, 23 предпочли экзопротез. 2-я группа: 34 пациентки, проведена радикальная резекция молочной железы, 34 использовали экзопротез, из них 12 задумывались об эндопротезировании. 3-я группа: 14 пациенток, проведена подкожная мастэктомия с эндопротезированием, из них 4 комбинированным методом (ТДЛ+ эндопротезирование). 4-я группа: 16 пациенток, проведена подкожная мастэктомия с аутомаммопластикой, из них 8 в 2017 году делали эндопротезирование. 5-я группа: 4 пациентки, проведена паллиативная циторедуктивная мастэктомия, из них 2 использовали экзопротез, 1 от протезирования отказалась. 6-я группа: 2 пациентки, проведена мастэктомия по HALSTED, обе пациентки использовали экзопротез. Послеоперационные осложнения после реконструктивной маммопластики составили 5, 714%.

Выводы

Пластические операции выполняются пациенткам независимо от объема выполненной операции и возраста. По данным проведенного анкетирования тема рака молочной железы остаётся для пролеченных пациентов психологически травмирующей. Несмотря на широкий спектр различных пластических операций количество послеоперационных осложнений незначительно.