

Анализ заболеваемости вич-ассоциированным ТУБЕРКУЛЁЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2012-2017)

Бедрицкая Наталья Анатольевна

*УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна, УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск*

Введение

Туберкулёз и ВИЧ - инфекция являются одними из наиболее важных проблем здравоохранения Беларуси. ВИЧ - инфекция предрасполагает к заражению, реактивации латентной туберкулёзной инфекции и возникновению рецидивов туберкулёза у ранее излеченных больных.

Цель исследования

Проанализировать заболеваемость и распространённость ВИЧ-ассоциированного туберкулёза населения РБ.

Материалы и методы

Изучена динамика заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза в РБ, рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости и показатели тенденций.

Результаты

ВИЧ-ассоциированный туберкулёз представляет серьёзный фактор риска нерезультативной химиопрофилактики у людей с этой инфекцией. ВИЧ может изменять течение туберкулёза непосредственно. При анализе многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза наблюдается умеренная тенденция к росту заболеваемости от 4,3 на 100 тыс. населения в 2012 году до 6,1 на 100 тыс. населения в 2017 году. При этом анализ годовых темпов прироста за период 2012 - 2017 гг. показал наименьший спад уровня заболеваемости в 2016 году.

В областной структуре заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза наибольший вклад вносит Гомельская область, где почти в 3 раза показатель заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза выше по сравнению с другими областями РБ, а наименьший – Гродненская. При этом уровень заболеваемости растёт во всех областях, кроме Витебской области. Максимальный рост заболеваемости наблюдался в городе Минске.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод об увеличении распространённости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза и его удельного веса среди контингентов больных туберкулезом. В связи с чем, проблема туберкулёза в условиях роста ВИЧ-ассоциированного туберкулёза требует дальнейшего повышения качества проводимых мероприятий, которые будут способствовать сохранению трудового потенциала республики и обеспечению социального благополучия населения.