

Федорович Е. В., Шамшурин А. И.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ

Научный руководитель: ассист. Чирак В. Э.

Кафедра травматологии и ортопедии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Поперечное плоскостопие является одной из наиболее распространенных статических деформаций стоп. По данным центрального научно-исследовательского института Травматологии и Ортопедии, поперечное плоскостопие наблюдается у 55,2% женщин и у 38,1% мужчин в возрасте старше 20 лет. Заболевание наиболее характерно для женщин в возрасте 35-50 лет и характеризуется прогрессирующим течением. Важность изучения данного заболевания обусловлена тем, что помимо косметического дефекта зачастую поперечное плоскостопие сопровождается болевым синдромом, нарушает опорную функцию конечности, затрудняет пользование стандартной обувью, что приводит к снижению трудоспособности.

Цель: Оценить структуру оперативных вмешательств по поводу поперечного плоскостопия на базе 6 ГКБ с января 2016 г. по март 2017 г.

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезней и журналы оперативных вмешательств ортопедических отделений 6 ГКБ, детально изучены протоколы оперативных вмешательств по поводу поперечного плоскостопия, обобщена полученная информация.

Результаты и их обсуждение. С января 2016 г. по март 2017 г. В ортопедических отделениях 6 ГКБ проходило лечение по поводу поперечного плоскостопия 35 человек. Структура пациентов в зависимости от пола: мужчины 1 (2,9%), женщины 34 (97,1%). Средний возраст пациентов получавших лечение по поводу поперечного плоскостопия 48 лет. Структура пациентов в зависимости от стороны заболевания: левостороннее плоскостопие 5 (14,3 %), правостороннее 5 (14,3%), двустороннее 15 (71,4 %). Структура операций по поводу поперечного плоскостопия: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная остеотомия основания I плюсневой кости 19 (57,2%), бурсэкзостозэктомия по Шеде, остеотомия основания основной фаланги 1 пальца 8 (22,9%), другие 7 (19,9%).

Выводы. 1. Несмотря на распространённость поперечного плоскостопия, количество пациентов получивших лечение составило лишь 35 человек. 2. Женщины чаще обращаются за лечением (97,1%). 3. Чаще наблюдается двустороннее поперечное плоскостопие (71,4%). 4. Наиболее частой операцией (либо этапом последовательного оперативного лечения) по поводу поперечного плоскостопия является: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная остеотомия основания I плюсневой кости (57,2%).