

Азёма Е. Н., Савостин А. П.
**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА**

Научный руководитель: ст. преп. Гонюняк С. В.
Кафедра фтизиопульмонологии

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель

Актуальность. Туберкулез (ТБ) является одной из основных проблем мирового здравоохранения, в частности и здравоохранения Республики Беларусь. По оценкам ВОЗ, ТБ остается одной из самых значимых неакушерских причин смерти женщин фертильного возраста, особенно в регионах неблагоприятных по ТБ.

Цель: оценить распространенность ТБ у женщин репродуктивного возраста в Гомельской области, определить долю женщин, у которых туберкулез был выявлен во время беременности и в послеродовом периоде за 2016 год.

Материалы и методы. Проведен анализ регистрационных форм 089-1/у, данных статистических отчетов по Гомельской области за 2016 год. Подсчитано абсолютное число случаев туберкулеза легких, впервые выявленного у женщин в возрасте 18-45 лет и показатель заболеваемости в данной гендерно-возрастной группе, определена доля женщин репродуктивного возраста от общего числа случаев впервые выявленного туберкулеза легких. Была также оценена динамика изучаемых показателей в течение двух лет. Статистическая обработка данных производилась при помощи программы Microsoft Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. По данным статистической отчетности в Гомельской области проживает 335885 женщин в возрасте 18-45 лет. В 2016 году было выявлено 567 новых случаев туберкулеза легких. Заболеваемость составила 39,9 на 100 тысяч населения. Число родов, зарегистрированных в Гомельской области в данном году, составило 17665.

Данные о числе новых случаев туберкулеза легких, выявленных у женщин в возрасте 18-45 лет в 2016 году, в том числе во время беременности и в послеродовом периоде, представлены в таблице 1.

За 2016 год у женщин в возрасте 18-45 лет выявлено 108 новых случаев ТБ, заболеваемость составила 32,2 ‰. Доля общего числа новых случаев ТБ составила 19%. Новых случаев ТБ, выявленных у женщин во время беременности – 9. Заболеваемость ТБ женщин во время беременности в послеродовом периоде составила 50,9 ‰.

Выводы. Заболеваемость туберкулезом женщин в возрасте 18-45 лет статистически не отличается от общего областного показателя. Доля женщин репродуктивного возраста от общего числа новых случаев туберкулеза составляет 19%. Заболеваемость туберкулезом женщин во время беременности и в послеродовом периоде достоверно выше, чем показатель в данной гендерно-возрастной группе ($p < 0,05$).