

## **Особенности течения псориаза в детском возрасте**

*Плотникова Анастасия Вячеславовна*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Сикорская Татьяна  
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Псориаз остается наиболее актуальной медико-социальной проблемой современной дерматологии, приводящей к значительному ухудшению качества жизни, снижению работоспособности и социальной активности пациентов. Дерматоз встречается у 1-5% населения планеты. Учащаются случаи тяжелых форм, трудно поддающихся лечению и приводящих к инвалидизации пациентов, с частыми и продолжительными рецидивами.

### **Цель исследования**

Определить характер субъективных жалоб (зуд, шелушение, болезненность) и тяжесть течения клинического процесса (оценка индекса PASI), а также частоту и характеристики сопутствующей патологии у пациентов с псориазом, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска за период 5 лет.

### **Материалы и методы**

В нашем исследовании было проанализировано 129 истории болезни пациентов с диагнозом псориаз в возрасте от 6 до 17 лет, стажем дерматологического заболевания от 1 недели до 13 лет. Ретроспективно выполнена оценка данных историй болезни сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическому заболеванию. Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Полученные данные интерпретировались как достоверные, а различия между показателями считались значимыми при величине безошибочного прогноза равной или больше 95% ( $p < 0,05$ ).

### **Результаты**

Нами проанализировано 129 историй болезни пациентов с псориазом, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» за период с декабря 2011 – февраль 2017 года. Среди пациентов было 67 мальчиков и 62 девочки, средний возраст  $12,4 \pm 3,3$  года, средний стаж заболевания составил  $27,6 \pm 32,3$  месяца. Анализируя стационарные карты пациентов, нами установлено, что у большинства пациентов (98,4%) были отмечены высыпания, зуд был отмечен только в половине случаев (51,9%), реже всего пациенты отмечали болезненность (4,7%). У 78% пациентов отмечается хронические очаги инфекции. У пациентов с хроническими очагами инфекции отмечается более тяжелое течение псориаза (PASI общ  $19 \pm 0,91$ ) в отличии от пациентов без микробной ассоциации ( $12,1 \pm 0,44$ ).

### **Выводы**

На основании полученных данных выявлено, что у пациентов детского возраста с заболеванием псориазом отмечается наличие очагов инфекции, которые в свою очередь влияют на тяжесть течения дерматоза.