

Предлежание плаценты и беременность

Капустина Анастасия Николаевна

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Милош Татьяна Сергеевна,

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Введение

Тема предлежания плаценты актуальна и на современном этапе развития медицины, так как этиология и патогенез данной патологии до конца не установлены. По данным литературы, предлежание плаценты встречается в 0,5-0,8% случаев от общего количества родов. Большой процент самопроизвольных аборт происходит в результате этой патологии.

Цель исследования

Изучить значение анамнестических данных при предлежании плаценты, установить структуру заболеваемости пациенток.

Материалы и методы

Исследованы истории болезней 41 женщины, находившихся на госпитализации в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 2014-2015 годы по поводу предлежания плаценты.

Результаты

Среди обследованных беременных избыточная масса тела выявлена у 17 (41,5%) женщин. В структуре гинекологического анамнеза у 19 (63,3%) женщин была диагностирована эрозия шейки матки, у 3 (10%) пациенток был выявлен хронический аднексит, поликистоз яичников – у 3 (10%) женщин, в 3,3% случаев – миома матки. В анамнезе среди экстрагенитальной патологии, выявленной у 56,1% пациенток, заболевания почек отмечены в 34,8% случаев, патология органов эндокринной системы наблюдалась у 13% случаев.

Выводы

В анамнезе женщин с предлежанием плаценты высока частота гинекологической и экстрагенитальной патологии. Среди обследованных пациенток отмечаются метаболические нарушения: увеличение массы тела, ожирение. Частота беременностей и родов повышают частоту данной патологии, однако у трети участниц предлежание плаценты регистрировалось в ходе первой беременности и родов, указывая на наличие других причин неправильной локализации плаценты.