

Влияние возраста и анамнеза женщины на развитие замершей беременности на сроке до 12-ти недель

Валько Анастасия Игоревна, Балашова Екатерина Олеговна

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук **Гузей Ирина Анатольевна,***

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск

Введение

Произведен анализ данных 83 женщин за период 2015-2016 год с диагнозом неразвивающаяся беременность в сроке до 12-ти недель. Выделены две группы: замершая беременность по типу гибели эмбриона, по типу анэмбрионии. Была выявлена зависимость между частотой искусственных абортов и выскабливаний в анамнезе, частотой воспалительных заболеваний органов малого таза.

Цель исследования

Возможность прогнозирования исхода беременности, учитывая факторы риска: возраст, образ жизни, данные анамнеза на вероятность развития неразвивающейся беременности (НБ) на сроке до 12-ти недель.

Материал и методы

Были изучены данные истории болезней 83 женщин, которые поступили в УЗ “Столбцовская ЦРБ” гинекологическое отделение за 2015-2016 год с диагнозом неразвивающаяся беременность (НБ) на сроке до 12-ти недель.

Результаты

Средний возраст женщин I-ой группы составил 31,02+(-) 6,43 лет, а II-ой – 29,03+(-) 5,98 лет.

Существует взаимосвязь между ЗБ и частотой встречаемости воспалительных заболеваний органов малого таза. Среди женщин с ЗБ воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе были выявлены у 47,2%, а в контрольной группе 18,9% ($p=0,01$).

Так же была выявлена зависимость между частотой искусственных абортов и лечебно-диагностических выскабливаний в анамнезе и последующей ЗБ ($p=0,02$). В группе женщин с ЗБ у 39 (46,99%) в анамнезе были искусственные аборты или лечебно-диагностические выскабливания, а это почти в 2 раза больше, чем в контрольной группе (25,66%).

Среди женщин с ЗБ по типу гибели эмбриона искусственное прерывание беременности в анамнезе было у 25 (51,02%), в группе с анэмбрионией у 13 (38,24%) женщин. Выскабливание стенок полости матки по медицинским показаниям в анамнезе было у 48 (57,83%) женщин с ЗБ, в контрольной группе у 32 (32%) женщин.

Выводы

Таким образом, для женщин с замершей беременностью характерно более частое наличие воспалительных заболеваний органов таза в анамнезе (у женщин с ЗБ воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе были выявлены у 47,2%, а в контрольной группе 18,9%), абортов и лечебно-диагностических выскабливаний стенок полости матки (у женщин с ЗБ в 46,99% в анамнезе были искусственные аборты или лечебно-диагностические выскабливания, а в контрольной группе 25,66%).