



Булыга Е. К.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Научный руководитель канд. мед. наук Бандацкая М. И.

Кафедра эпидемиологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно регистрируется около 500 тыс. новых случаев рака данной локализации и 250 тыс. случаев смерти в результате этого заболевания. РШМ занимает второе место по частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин, уступая лишь раку молочной железы. В структуре онкогинекологической патологии в мире РШМ составляет 15%, а смертность от него достигает 8%. В Беларуси каждые 2 дня РШМ выявляется у 5-ти женщин. Каждый день от него умирает 82 жительницы Европы, одна и них - белоруска.

Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса РШМ в Республике Беларусь (РБ).

Материалы и методы. Материалами явились данные официальной регистрации случаев РШМ в Беларуси за период с 2007 по 2016 гг. Нами проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование.

Результаты и обсуждение. При изучении эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь было установлено, что с 2007 по 2016 гг. заболеваемость РШМ находилась в пределах от 12,9 на 100 000 населения в 2008 до 18,9 на 100 000 населения в 2011 г. Многолетняя динамика характеризовалась стабильной тенденцией. Распределение заболеваемости по возрасту имело свои характерные особенности. Заболеваемость возрастала с 15 до 39 лет, далее до 60 лет оставалась почти на одном уровне, затем с увеличением возраста.

Среди административных территорий наиболее высокая заболеваемость регистрировалась среди жителей Гродненской области, а наиболее низкие показатели в Витебской области и г. Минске. При сравнении заболеваемости сельского населения наибольший уровень заболеваемости наблюдался среди жителей Гродненской области, а наименьший – Витебской. Во всех регионах наблюдается превышение заболеваемости сельского населения по сравнению с городским. Среди городских жителей самые высокие показатели зарегистрированы в Гродненской области.

Рост заболеваемости может свидетельствовать об улучшении качества диагностики при выявлении большего числа больных на ранних стадиях заболевания. В 2011 г. по сравнению с 2006г. выявление РШМ на ранних стадиях возросло. Из них выявленных при профилактических осмотрах составило 90%.

Многолетняя динамика заболеваемости инвазивным раком характеризовалась стабильной тенденцией, а преинвазивным – выраженной тенденцией к росту

Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости РШМ характеризовалась стабильной тенденцией при выраженной тенденции к росту числа выявленных предраковых состояний. Это свидетельствует о том, что ресурс проводимых скрининговых программ не достаточен для существующего бремени данной патологии.