



*Соколова С. Д.*

## **ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ПОЛУЧИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ В БОГУШЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЕ**

*Научные руководители канд. мед. наук, доц. Будрицкий А. М., канд. мед. наук, доц.  
Серёгина В. А., канд. мед. наук, доц. Правада Н. С.*

*Кафедра фтизиопульмонологии*

*УО "Витебский государственный медицинский университет", г. Витебск*

**Актуальность.** Проблема туберкулеза на современном этапе остается в нашей стране актуальной. Это, прежде всего, высокая распространенность лекарственно - устойчивого туберкулеза и сложности в лечении пациентов в случае рецидива туберкулеза, неудачи в лечении, отрыва от лечения. Среди отягощающих факторов, оказывающих негативное влияние на течение и исход туберкулеза ведущее место занимают злоупотребление алкоголем и курение.

**Цель:** проанализировать демографический, социальный статус и клинические формы туберкулеза легких у пациентов, получивших лечение в Богущевской областной противотуберкулезной больнице с 2012 по 2016 годы.

**Материалы и методы.** Ретроспективный анализ 566 историй болезни пациентов с туберкулезом легких, пролеченных в Богущевской областной противотуберкулезной больнице на протяжении 5 лет.

**Результаты исследования.** На протяжении 5 лет среди пациентов преобладали лица мужского пола (более 80%), причем сельские и городские жители болели примерно одинаково часто. Обращает внимание, что лица без определенного места жительства составили от 0,8% до 5,2%. Среди пациентов преобладали лица трудоспособного возраста (от 64% до 70,8% от всех пациентов). Из них неработающие составили довольно высокий процент (от 36,2% до 65,6%), инвалиды – от 12 до 24,1%. Лица пенсионного возраста составили от 6,9% до 16,9%. Традиционно, большинство пациентов с туберкулезом легких имели сочетание вредных привычек в виде табакокурения и злоупотребления алкоголем (от 66,2% до 80,2%). Среди пациентов с туберкулезом легких преобладал инфильтративный туберкулез легких. У пациентов с инфильтративным, диссеминированным, фиброзно-кавернозным туберкулезом легких установлены вновь выявленные случаи, рецидивы, неудачи в лечении, случаи после отрыва от лечения. Случаи казеозной пневмонии и туберкуломы встречались довольно редко.

**Выводы.** Туберкулез легких по-прежнему встречается чаще у мужчин трудоспособного возраста. Сельские и городские жители болеют туберкулезом одинаково часто. Более 80% пациентов с туберкулезом легких имели вредные привычки в виде табакокурения и злоупотребления алкоголем.