

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАРГИНАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТА

Байтус Н.А.

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Заболевания периодонта имеют высокую распространенность и интенсивность у населения РБ. В литературе отсутствуют сведения о частоте встречаемости деструктивных форм апикального периодонтита у лиц с заболеваниями маргинального периодонта.

Цель исследования: изучение распространенности деструктивных форм апикального периодонтита у пациентов с заболеваниями маргинального периодонта.

Материалы и методы. Провели ретроспективный анализ 385 стоматологических амбулаторных карт пациентов УЗ «8 городская поликлиника» г. Минска. Регистрировали паспортные данные, индексы КПУ, ОНI-S, КПИ, количество зубов с деструктивными формами апикального периодонтита, степень тяжести патологии маргинального периодонта в возрастных группах 18–24 года, 25–34 года, 35–44 года, 45–54 года, 55–64 года, 65–89 лет.

Результаты. Установили, что в 364 случаях из 385 (94,5 %) у пациентов имелись заболевания маргинального периодонта. Средние показатели индекса КПУ во всех группах соответствовали высокой интенсивности кариеса и варьировали от $17 \pm 3,86$ в группе 18–24 года до $28 \pm 8,67$ в группе 65–89 лет. Значения индекса ОНI-S колебались от $1,8 \pm 1,03$ до $2,4 \pm 1,15$. Средние показатели КПИ также имели тенденцию к увеличению с возрастом пациентов, причем в группе 18–24 года они составляли $1,8 \pm 1,13$, а в группе 65–89 лет — $2,6 \pm 1,18$. Частота встречаемости деструктивных форм хронического апикального периодонтита в группе 18–24-летних достигала 37,5 %. Аналогичный показатель в группе 45–54 лет равнялся 64,71 %. В группе 65–89 лет частота встречаемости зубов с деструктивными изменениями составляла 54,24 %. Диагнозы «простой маргинальный гингивит» и «простой периодонтит легкой и средней степени» преобладали у 18–44-летних, «периодонтит средней и тяжелой степени тяжести» у 45–89-летних.

Таким образом, выявлена высокая интенсивность и распространенность заболеваний маргинального периодонта во всех возрастных групп и зарегистрирована высокая частота встречаемости зубов с деструктивными изменениями в апикальном периодонте.