

РЕЦИДИВНЫЕ ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

*Иванова Т.Е.¹, канд. мед. наук, доцент, Богдан В.Г.¹, канд. мед. наук, доцент, Кузьмин Ю.В.¹,
канд. мед. наук, доцент, Рябцев В.В.¹, Дорох Н.Н.², канд. мед. наук, доцент*

¹Белорусский государственный медицинский университет

²4-я городская клиническая больница им Н.Е. Савченко

Проблема рецидивов — одна из важнейших в герниологии. В настоящее время рецидивы паховых грыж составляют 10–15 % после первичных операций.

Цель исследования: изучить причины возникновения и оценить результаты хирургического лечения рецидивных паховых грыж по данным городского центра герниологии и бариатрической хирургии.

Материалы и методы. Изучены истории болезней и проведен опрос 77 пациентов, оперированных по поводу рецидивных паховых грыж с 2009 по 2010 гг. Из них 76 (98,7 %) мужчины и 1 (1,3 %) женщина. Основная масса пациентов с рецидивными паховыми грыжами была старше 50 лет — 62 (80,6 %), из них 43 (56 %) — старше 60 лет.

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов был 1 рецидив грыжи — 61 пациент (79 %), 2 рецидива — у 11 (14,5 %), 3 — у 5 (6,5 %) пациентов. Основное количество рецидивов возникло в сроки менее 5 лет — 30 (43,5 %) пациентов. Сопутствующие заболевания были выявлены у 59 пациентов (76,6 %). Из протоколов операций установлены первичные варианты пластик пахового канала: пластика передней стенки — 63 пациентам (82 %), задней стенки — 6 пациентам (7,5 %). После пластики с сетчатым имплантатом возникло 3 рецидива (3,8 %), после пластики по Лихтенштейну — один (1,3 %). Установить вид пластики не удалось у 5 пациентов.

Для устранения рецидива выполнены следующие виды пластики: по Лихтенштейну — 60 (78 %), по Постемскому — 8 (10,4 %), по Бассини — 4 (5,1 %), другие виды пластики — 5 (6,5 %).

Отдаленные результаты лечения прослежены у 69 пациентов (89,6 %) в сроки от 2 лет до 4 месяцев методом опроса. Рецидив отмечен у 1 (1,44 %) пациента после операции Wantz без фиксации сетчатого имплантата.

Заключение. Основное количество рецидивов развилось после пластики передней стенки пахового канала. Пластика по Лихтенштейну показала хорошие как ближайшие, так и отдаленные результаты в лечении рецидивных паховых грыж. Операции по поводу рецидивных паховых грыж должны выполняться в специализированных центрах.