

# КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАГРИППА У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

*Каишкан А.М.<sup>1</sup>, Сергиенко Е.Н.<sup>2</sup>, Комаровская А.С.<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>Городская детская инфекционная клиническая больница*

*<sup>2</sup>Белорусский государственный медицинский университет*

Целью нашей работы явилось изучение клинических особенностей парагриппа у пациентов, госпитализированных в УЗ «ГДИКБ» в 2010–2011 гг.

*Материалы и методы.* Для изучения клинико-лабораторных особенностей парагриппа I–III типов проведен ретроспективный анализ историй болезней 48 детей (I тип — 18 детей, II тип — 15 детей и III тип — 15 детей) от 3 месяцев до 8 лет с лабораторно подтвержденным диагнозом парагрипп (метод ПЦР). По возрастному составу пациенты распределились следующим образом: до 1 года — 16 (33 %), 1–3 года — 25 (52 %), старше 4 лет — 7 (15 %). Таким образом, преобладали дети первых 3 лет жизни, что связано с АФО верхних дыхательных путей у детей данного возраста и тропностью вирусов парагриппа.

*Результаты и их обсуждение.* Как и для любых ОРВИ, для парагриппа характерен синдром лихорадки и катаральный синдром. У 86 % пациентов отмечалось повышение температуры, среднее значение составило 38,5 (min — 37,5 max — 39,6), средняя длительность — 2,2 дня, достоверных различий у пациентов с парагриппом I–III типов не выявлено. Основной клинической формой заболевания был ларинготрахеит. Компенсированный стеноз наблюдался у 18 пациентов (69 %), субкомпенсированный и декомпенсированный — у 8 (31 %). Только одному ребенку с субкомпенсированным стенозом по непонятным причинам на догоспитальном этапе не вводились ГКС. При этом следует отметить, что врачи скорой помощи оказывают адекватную помощь на догоспитальном этапе с учетом степени стеноза. Длительность катарального синдрома в среднем составила 5,7 дней, стеноза гортани — 3,4 дня. Таким образом, клиническая картина характеризуется наличием 2 синдромов — умеренно выраженная интоксикация (длительность лихорадки 2,0–2,4 дня) и респираторного, основной клинической формой заболевания является ларинготрахеит с компенсированным стенозом гортани.