

*Поливода А. Э.*

**РАК ЖЕЛУДКА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАСТРОБИОПСИЙ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Брагина З. Н.*

*Кафедра патологической анатомии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Рак желудка в настоящее время еще остается одним из самых распространенных онкозаболеваний в мире. В Беларуси в 2017 г. в структуре общей онкологической заболеваемости РЖ занял 4-е место (8.8%) у мужчин и 5-е (5.7%) у женщин. Склонность к этой патологии в РБ за 2017г. составляет 18,2 на 100 тыс. населения. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости в большинстве стран мира, результаты лечения остаются все еще неудовлетворительными. И актуальным методом в диагностике рака желудка является изучение гастробиопсий, что позволяет точно и своевременно поставить окончательный диагноз.

**Цель:** изучить клинико-морфологические особенности рака желудка по материалам гастробиопсий.

**Материалы и методы диагностики.** Изучен архивный материал гастробиопсий за 2017-2018 гг. в Минском ГПАБ.

**Результаты и их обсуждение.** Было исследовано 46 гастробиоптатов с диагнозом: рак желудка. У всех больных клинически был выставлен диагноз: РЖ или подозрения к нему. Проведенное гистологическое исследование подтвердило рак в 34 случаях (79,1%). Возраст больных, страдающих данной патологией, колебался от 49 до 87 лет, средний возраст – 70лет. Наиболее часто он диагностировался в возрасте более 80-ти лет. Мужчин было – 27 (58,6%), женщин – 19 (41,3%), соотношение М:Ж - 1,42 :1. Гистологически преобладали аденокарциномы – 27 наблюдений (58,6%). Высокодифференцированные составили – 2 (4,3%) случая, умереннодифференцированные – 7 (15,2%), низкодифференцированные – 16 (34,7%). Менее редко выявлялся недифференцированный рак – 7 наблюдений (15,2%), 5 из которых (10,8%) соответствовали перстневидно-клеточной карциноме.

**Выводы.** 1. Возраст больных, страдающих РЖ колебался от 49 до 87 лет (средний возраст – 70лет). Мужчины – 27 больных (58,6%), женщины – 19 больных (41,3%), соотношение М:Ж - 1,42:1. Наиболее уязвимым оказался возраст 14 больных (30,4%), который составил более 80 лет. При гистологическом исследовании наиболее часто в этой группе оказались аденокарциномы – 13 случаев (28,2%), из которых низкую дифференцировку имели 10 (21,7%).

2. Среди гистологических форм преобладали аденокарциномы различной степени дифференцировки: высокодифференцированные – 2 (4,3%), умереннодифференцированные – 7 (15,2%), низкодифференцированные – 16 (34,7%).