

Гокин А. Г., Зубцов М. С.

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ ОПУХОЛЕВОГО
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хвостовой В. В.

Кафедра онкологии

Курский государственный медицинский университет, г. Курск

Актуальность. Стадия опухолевого процесса, при которой выявлена меланома кожи, а также стадия, при которой произведено хирургическое лечение, напрямую влияют на прогноз жизни пациента. Так, хирургическое лечение меланомы кожи позволяет добиться практически 90% 10-летней выживаемости больных в том случае, если меланома выявлена и иссечена при толщине опухоли по Бреслоу менее 1 мм, т.е. на IA стадии. При выявлении опухоли большей толщины прогноз значительно ухудшается. Так, для опухоли толщиной 1-2 мм 10-летняя выживаемость составляет 64-80%, для опухоли от 2 до 4 мм 10-летняя выживаемость составляет 53-64 %, при толщине опухоли по Бреслоу более 4 мм 10-летняя выживаемость составляет менее 50%. В связи с этим особенно актуальным представляется изучение данной проблемы.

Цель: сравнительное изучение различных стадий опухолевого процесса у больных с первичной меланомой кожи.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ патологоанатомических заключений 686 пациентов в возрасте от 5 до 95 лет, которым было выполнено оперативное удаление меланомы кожи на территории Курской области за период 2008-2017 гг. Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием программного обеспечения Statistica 8.0.

Результаты и их обсуждение. Из 686 операций 441 (64%) выполнено женщинам, 245 (36%) – мужчинам. Средний возраст больных меланомой кожи за изучаемый период составил $61,8 \pm 15,79$ лет. Заболевание на начальных стадиях (толщина опухоли по Бреслоу менее 2 мм) выявлено у 54 мужчин и 95 женщин. Средний возраст больных составил $56,97 \pm 15,88$ лет. Заболевание на поздних стадиях (толщина опухоли по Бреслоу более 2 мм) выявлено у 191 мужчины и 346 женщин. Средний возраст больных составил $63,15 \pm 15,17$ лет. Однако более пессимистичным представляется тот факт, что при изучении количества пациентов с запущенными стадиями заболевания в динамике также не наблюдается тенденции к снижению (среднегодовой темп прироста составил 8,16% у мужчин и 6,36% у женщин).

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено многократное преобладание пациентов с поздними стадиями над пациентами с начальными стадиями меланомы кожи (в 3,53 раза у мужчин и в 3,64 раза у женщин). Разница в среднем возрасте прооперированных пациентов связана с естественными механизмами роста и развития опухоли. На территории Курской области отмечается рост количества операций с удалением меланомы кожи на 3 и 4 стадиях заболевания по Бреслоу, что соответствует общемировым и всероссийским показателям.