

*Левчик Е. В.*

## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

*Научный руководитель ст. преп. Живицкая Е. П.*

*Кафедра иммунологии и экологической эпидемиологии*

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск*

**Актуальность.** Существует масса методик и критериев для оценки благополучия и здоровья населения. Одним из критериев является заболеваемость, помогающая определить состояние здоровья населения и способствующая успешному планированию медицинских мероприятий. В связи с этим, вопрос о мониторинге здоровья населения остается актуальным для системы здравоохранения.

**Цель:** провести анализ общей и первичной заболеваемости в Республике Беларусь за 2006-2016 гг.

**Материалы и методы.** По результатам ретроспективного анализа данных официальных статистических сборников «Здравоохранение в Республике Беларусь» за 2006-2016 года были изучены закономерности развития заболеваемости населения Республики Беларусь: проанализирована динамика, определены основные тенденции, изучена структура заболеваемости.

**Результаты и их обсуждение.** За анализируемый промежуток времени (2006-2016 гг.) показатели общей и первичной заболеваемости населения Республики Беларусь имеют тенденцию к росту. Среднегодовой показатель прироста первичной заболеваемости составил 0,39%, а общей – 1,36%.

Среди взрослого населения наблюдается рост общей и снижение первичной заболеваемости. Общая и первичная заболеваемость детского населения выше, чем аналогичные показатели взрослого населения. Наблюдается рост показателей заболеваемости. Среднегодовой прирост общей и первичной заболеваемости составил 0,7% и 1,12% соответственно. Наибольший темп прироста отмечен в 2009 году и составил 12,5 % для первичной заболеваемости и 10,3% для общей заболеваемости.

В 2016 г. в структуре первичной заболеваемости всего населения Республики Беларусь первое ранговое место занимают болезни органов дыхания (53,4%), на втором месте находятся травмы и отравления (9,1%) и на третьем месте – болезни кожи (5,1%).

Проведенный сравнительный анализ общей заболеваемости по регионам Республики Беларусь показал следующее распределение заболеваемости: на первом месте – г. Минск (19,3% всех заболевших в республике за период 2006-2016 гг.), на втором месте Гомельская область (14,9%), на третьем - Минская область (14,3%), четвертое место занимает Витебская область (13,8%), пятое – Брестская (12,7%), шестое – Гродненская (12,5%) и на седьмом месте Могилёвская область (12,4%).

**Вывод.** Таким образом, анализ общей и первичной заболеваемости населения Республики Беларусь за 2006-2016 гг. продемонстрировал в большинстве своём негативную динамику. Результаты исследования показали, что наибольший вклад в развитие заболеваемости вносят болезни органов дыхания. Также по результатам сравнительного анализа было выявлено неравномерное распределение заболеваемости по областям Республики Беларусь. Это должно учитываться при планировании и проведении массовых лечебно-профилактических мероприятий, а также при модернизации и переоснащении медицинских учреждений.