

*Маханьков Е. И.*

**АССОЦИИРОВАННОСТЬ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА И БОЛЕЗНИ КРОНА С  
ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ РТА**

*Научный руководитель д-р. биол. наук, доц. Гасич Е. Л.*

*Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

В последнее десятилетие резко возрос интерес стоматологов к хроническим воспалительным заболеваниям желудка и кишечника, которые связаны с ростом заболеваемости населения, потерей трудоспособности пациентов, возможностью тяжелых осложнений, жалобами и патологическими изменениями со стороны полости рта. Ротовая полость является начальным звеном пищеварительной системы, поэтому патологические изменения в последней ведут к развитию каскада процессов, в результате которых происходит нарушение нормальной функции зубочелюстной системы. Одним из компонентов зубочелюстной системы является периодонт, состоянию которого в настоящее время в стоматологии уделяется большое внимание исследователей к изучению его патогенеза и терапии. В ряде исследований показано, что в возникновении и развитии болезней периодонта принимают участие множество экзогенных и эндогенных факторов, среди которых выделяют как уровень гигиены полости рта, так и соматическую патологию. Наблюдается взаимосвязь между заболеваниями желудка, вызванным *Helicobacter pylori*, развитием периодонтита и изменениями слизистой оболочки полости рта. Так, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка часто ассоциированы с гингивитом, периодонтитом, афтозными поражениями слизистой оболочки щек, губ, языка. Устойчивая связь отмечается между патологией периодонта и заболеваниями кишечника, в том числе, например, при болезни Крона в периодонте обнаруживают морфологические изменения – лимфоидные гранулемы. На фоне заболеваний органов пищеварения нарушается функциональная активность слюнных желез, динамическое равновесие процессов де- и реминерализации эмали, что способствует возникновению и активному течению кариозного процесса.

В связи с вышеизложенным, пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и болезнью Крона должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении врача-стоматолога с проведением необходимых профилактических и лечебных мероприятий с целью предупреждения развития патологии полости рта.