

*Яварович П. В., Нагорский А. В.*

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ  
РЕЗЕКЦИИ КАК МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЬЮ ГОЛОВКИ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

*Научные руководители канд. мед. наук, доц. Антиперович О. Ф.,*

*д-р мед. наук, проф. Алексеев С. А.*

*Кафедра общей хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Панкреатодуоденальная резекция подразумевает удаление головки поджелудочной железы с опухолью, холецистэктомия, пересечение общего желчного протока выше впадения пузырного и одновременное пересечение желудка на уровне дистальных двух третей с малым сальником и правой половиной большого сальника с дистальной границей резекции на уровне первой петли тощей кишки. Также удалению подлежат прилежащие регионарные лимфатические узлы. На сегодняшний день эта операция не является распространённой, что связано, в основном, с её сложностью, большим объёмом оперативного вмешательства, а также с широким перечнем противопоказаний. Именно эти факторы осложнили анализ результатов использования панкреатодуоденальной резекции как метода лечения с позиций доказательной медицины. Однако, независимо от частоты применения данного метода лечения, он должен быть изучен в полном объёме, что и подтверждает актуальность настоящего исследования.

**Цель:** оценить результаты хирургического лечения пациентов с опухолью головки поджелудочной железы посредством панкреатодуоденальной резекции.

**Материалы и методы.** В ходе проведения настоящего исследования были отобраны и проанализированы медицинские карты 13 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» с 2013 по 2019 годы, которым была выполнена панкреатодуоденальная резекция.

Среди пациентов, вошедших в выборку, насчитывалось 12 мужчин и 1 женщина. Возраст пациентов на момент операции составлял от 40 до 80 лет.

В ходе исследования были проанализированы результаты лабораторных и инструментальных исследований. Также было проанализировано состояние здоровья данных пациентов на момент проведения настоящего исследования.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов прикладных программ STATISTICA 13.5.0.17 и Microsoft Excel.

**Результаты и их обсуждение.** Статистический анализ лабораторных исследований показал положительную динамику процесса в послеоперационном периоде, что подтверждают и инструментальные исследования. В ближайшем послеоперационном периоде осложнений не выявлено. Полученные данные в сумме с исследованиями состояния здоровья пациентов в отдалённой перспективе позволяют говорить об успешности проведённого лечения.

**Выводы.** Таким образом результаты настоящего исследования показывают, что панкреатодуоденальная резекция, при отсутствии противопоказаний, может являться операцией выбора, позволяющей эффективно устранить основной патологический процесс и его осложнения в виде механической желтухи, болевого синдрома и значительно улучшить качество жизни пациентов.