

Мацар Н. В., Мартинович В. В.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А.

Кафедра патологической анатомии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Самым частым заболеванием у мужчин 40-80 лет является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). В тоже время, рак предстательной железы (РПЖ) – самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин. Причины возникновения, как ЛГПЖ, так и РПЖ доподлинно неизвестны. Обычно появившаяся ДГПЖ развивается медленно и в большинстве случаев к РПЖ отношения не имеет. Однако регистрируются случаи одновременного развития доброкачественной гиперплазии и рака. А иногда длительно существующая ДГПЖ, возможно, перерождается в рак. Симптомы этих двух заболеваний схожи, поэтому изучение причины и ранняя диагностика критичны, для продолжения корректного лечения данной патологии.

Цель: установить частоту выявления рака предстательной железы у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили амбулаторные карты, а также биопсийный материал пациентов с ДГПЖ, которым в УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» в 2005 г. была выполнена первая биопсия предстательной железы (ПЖ) в связи с подозрением на рак.

Результаты и их обсуждение. В 2005 году было обследовано 818 пациентов с диагнозом ДГПЖ. У 123 пациентов был выявлен РПЖ (удельный вес из общего числа обследованных составил 15,04%, из них пациенты с I-II стадиями составили 38,2% и III-IV стадиями – 61,8%). Пациенты, у которых не был выявлен РПЖ на биопсии 2005 г., оставлены для дальнейшего наблюдения. В 2006 году из данной категории было выявлено 8 пациентов с РПЖ (1,1% из числа негативных биопсий 2005 г., из которых I-II и III-IV стадии составили по 50%). В 2007 году выявлено 10 случаев РПЖ (1,2% из числа негативных биопсий 2005-2006 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 70% и 30% соответственно). В 2008 году выявлено 5 случаев рака (0,7% из числа негативных биопсий 2005-2007 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 20% и 80% соответственно). В 2009 году выявлено 4 пациента с раком ПЖ (0,6% из числа негативных биопсий 2005-2008 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 50%). В 2010 году выявлено 2 пациента с раком ПЖ (0,3% из числа негативных биопсий 2005-2009 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 50%).

Выводы. Частота выявления рака предстательной железы у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы составила 18,6%, из которых у 15,04% рак был выявлен на первой биопсии. При последующем наблюдении пациентов с первичной негативной в отношении рака биопсией в течении 5 лет было выявлено еще 29 случаев РПЖ (4,2% от негативных биопсий), среди которых 44,8% составили случаи III-IV стадии опухолевого процесса.