

**Колесова М.И., Гараева М.Д.**  
**СУИЦИД: ПРИЧИНЫ, СТАТИСТИКА**  
**Научный руководитель: ст. преп. Будько М.Е.**

*Кафедра белорусского и русского языков  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Цель данной работы: рассмотреть причины суицидов в нынешнее время, используя статистические данные и примеры.

Самоубийство, суицид (от лат. *sui caedere* «убивать себя») — преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. Около 90% людей, покончивших собой, имели психические расстройства. Одной из самых распространённых причин суицида являются проблемы в личной жизни. В числе событий, которые могут подтолкнуть человека к суициду – смерть близкого, тяжелая болезнь члена семьи, развод, расставание, безответная или несчастная любовь, одиночество, сложности в отношениях с родителями. В отдельную категорию причин суицида следует вынести доведение до самоубийства, например, когда подростки кончали жизнь из-за буллинга в школе со стороны ровесников. Ещё одной причиной суицида может являться подражание своим кумирам (Мэрилин Монро, Хемингуэй, Кобейн, Честер Беннингтон, Владимир Маяковский, Марина Цветаева др.)

В подавляющем большинстве случаев (четыре из пяти) самоубийцы прибегают к повешению. Каждый двадцатый делает свой последний шаг с высоты, каждый тридцатый принимает яд. Реже счёты с жизнью сводят с помощью колюще-режущих предметов или огнестрельного оружия. Доли процента приходятся на утопление, самосожжение, применение транспорта и электрического тока. По статистике, суицид занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15-29 лет. На сегодняшний день число людей, покончивших жизнь самоубийством намного больше, чем количество людей, убитых на войне. Убивают себя в 4 раза больше мужчины, чем женщины.

Таким образом, причины, по которым люди пытаются покинуть этот мир, разнообразны и сложны, часто связаны с сильной эмоциональной или физической болью, которую человек считает невыносимой.