

Калинина А. М.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.

Кафедра пропедевтики детских болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта – одна из наиболее распространенных проблем в детской гастроэнтерологии. По данным различных авторов чаще среди детей и подростков выявляется функциональная диспепсия (до 28% случаев). В соответствии с Римскими критериями IV функциональная диспепсия у детей разделяется на два варианта: постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС) и эпигастральный болевой синдром (ЭБС). Механизмы развития данных расстройств остаются недостаточно изученными, что требует проведение дальнейших исследований, направленных на изучение причин развития функциональной диспепсии у детей и проявлений, вызванные ими.

Цель: изучить основные клинические проявления функциональной диспепсии у детей младшего и старшего школьного возраста в Республике Беларусь.

Материалы и методы. Проведён анализ структуры заболеваний, явившихся поводом для госпитализации в гастроэнтерологическое отделение «УЗ 4-я Детская клиническая больница» за 2019 год, с акцентом на диагноз функциональная диспепсия; в последующем проведён анализ (n=65) структуры основных жалоб пациентов с диагнозом функциональная диспепсия.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что функциональная диспепсия в структуре госпитализированных больных составляет 9%, основными жалобами больных являлись боли (45 из 65): связанные с приемом пищи (32) и не связанные с приемом пищи (13), чувство тошноты (14 из 65), отрыжка (7 из 65), неприятный запах изо рта (12 из 65). Продолжается изучение частоты встречаемости отклонений по данным УЗИ и копрограмм.

Выводы. Среди функциональной диспепсии у детей в Республики Беларусь преобладает вариант – эпигастральный болевой синдром. Полученная клиническая характеристика функциональной диспепсии помогает в диагностике данной патологии.